

### Megoldásvázlatok, megjegyzések

1. Előfordul-e, és ha igen, hányszor, hogy (a) 2; (b) 5; (c) 11; (d) 25 egymást követő négyzetszám összege is négyzetszám?

*Megoldás:* (a) Az  $x^2 + (x+1)^2 = y^2$  egyenletet 2-vel szorozva és rendezve  $(2x+1)^2 - 2y^2 = -1$ , azaz  $z^2 - 2y^2 = -1$  adódik, ahol  $z$  automatikusan páratlan, így ez az eredetivel ekvivalens. Ennél az ún. Pell-típusú egyenletnél érdemes a bal oldalt a valós számok körében szorzattá bontani:  $(z - y\sqrt{2})(z + y\sqrt{2}) = -1$ . Azonnal látszik, hogy  $z = y = 1$  megoldás, azaz (\*)  $(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = -1$ . Ha ezt pl. köbre emeljük, akkor egy újabb megoldást kapunk:  $(1 - \sqrt{2})^3(1 + \sqrt{2})^3 = (1 - 3\sqrt{2} + 3 \cdot 2 - 2\sqrt{2})(1 + 3\sqrt{2} + 3 \cdot 2 + 2\sqrt{2}) = (7 - 5\sqrt{2})(7 + 5\sqrt{2}) = -1$ , azaz  $z = 7$ ,  $y = 5$ , vagyis  $x = 3$ ,  $y = 4$  megoldás (ami persze rögtön is látszik). Az eljárást ismételve (vagy (\*)-ot tetszőleges páratlan hatványra emelve) végtelen sok megoldást kapunk.

(b) Nincs megoldás:  $(x-2)^2 + (x-1)^2 + x^2 + (x+1)^2 + (x+2)^2 = y^2$ ; átalakítva  $5(x^2 + 2) = y^2$ , tehát  $5 \mid x^2 + 2$ , ami nem lehet, mert egy négyzetszám nem adhat 3 maradékot 5-tel osztva.

(c) Végtelen sok megoldás:  $(x-5)^2 + \dots + (x+5)^2 = y^2$ ; átalakítva  $11(x^2 + 10) = y^2$ , ez pontosan akkor teljesül, ha  $x^2 + 10 = 11t^2$ , azaz  $-10 = x^2 - 11t^2 = (x - t\sqrt{11})(x + t\sqrt{11})$ . Megoldás  $x = t = 1$ , azaz (\*\*)  $(1 - \sqrt{11})(1 + \sqrt{11}) = -10$ . Hatványozással nem tudunk új megoldásokat kapni, hiszen a  $-10$  nem marad meg. Viszont az  $1 = x^2 - 11t^2 = (x - t\sqrt{11})(x + t\sqrt{11})$  egyenletnek  $x = 10$ ,  $t = 3$  megoldása, és ebből hatványozással végtelen sok megoldást kapunk, amelyeket (\*\*) -gal kombinálva az eredeti feladat végtelen sok megoldását nyerjük, pl.  $-10 = (-10) \cdot 1 = (1 - \sqrt{11})(1 + \sqrt{11})(10 - 3\sqrt{11})(10 + 3\sqrt{11}) = (43 - 13\sqrt{11})(43 + 13\sqrt{11}) = 43^2 - 11 \cdot 13^2$ , azaz  $x = 43$ ,  $t = 11$ , ahonnan  $y = 11t = 143$ , tehát  $38^2 + 39^2 + \dots + 48^2 = 143^2$ .

(d) Egy megoldás van:  $(x-12)^2 + \dots + (x+12)^2 = y^2$ ; átalakítva  $25(x^2 + 52) = y^2$ , ez pontosan akkor teljesül, ha  $x^2 + 52 = t^2$ , azaz  $52 = t^2 - x^2 = (t-x)(t+x)$ , ahonnan  $t = 14$ ,  $x = 12$ ,  $y = 5t = 70$ ;  $0^2 + 1^2 + \dots + 24^2 = 70^2$ .

*Általánosítások:* (A)  $p$  egymást követő négyzetszám esetén, ahol  $p > 3$  prím:  $(x - (p-1)/2)^2 + \dots + (x + (p-1)/2)^2 = y^2$ ; az első  $(p-1)/2$  négyzetszám összegképlete alapján  $p(x^2 + (p^2-1)/12) = y^2$ , tehát szükséges feltétel:  $p \mid x^2 + (p^2-1)/12$ , azaz 36-tal szorozva  $(6x)^2 \equiv 3 - 3p^2 \equiv 3 \pmod{p}$  megoldható. A Legendre-szimbólum tulajdonságai alapján  $p = 12k \pm 5$  esetén a kongruencia nem oldható meg, tehát ekkor  $p$  egymást követő négyzetszám összege nem lehet négyzetszám, sőt semmilyen teljes hatvány sem. Ugyanez a gondolatmenet  $k$  egymást követő négyzetszám esetén is érvényes, ha  $k$  páratlan és van  $p = 12k \pm 5$  alakú prímosztója, amelynek a négyzete nem osztója  $k$ -nak. A négyzetszámok mod 8 maradékait vizsgálva adódik, hogy pl.  $k = 8t + 4$ ,  $16t + 3$  stb. esetén sincs megoldás. Hasonlóan lehet mod 9 stb. vizsgálatával kimutatni, hogy bizonyos  $k$  értékekre nincs megoldás.

(B) Az (a) feladat átfogalmazható úgy is, hogy hány olyan egész oldalú derékszögű háromszög van, amelyben a két befogó mérőszáma szomszédos. Kérdezhetjük, mi a helyzet, ha a két befogó eltérése  $k$ , de az oldalhosszak relatív prímekek (ez utóbbi feltétel nélkül könnyen visszavezethetjük a  $k = 1$  esetre).

2. A számok hány százaléka áll elő két négyzetszám különbségeként? És hány százaléka áll elő három négyzetszám összegeként?

*Megoldás:* Ezt a következőképpen kell érteni: legyen  $f(n)$  az  $1, 2, \dots, n$  egészek közül a megfelelők száma, ekkor a keresett arány (vagy valószínűség) a  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/n$  határérték. Mivel a  $k = x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$  diofantikus egyenlet pontosan akkor oldható meg, ha  $k$  felírható két azonos paritású osztója szorzataként, azaz ha páratlan vagy osztható 4-gyel, ezért csak a  $4t + 2$  alakú egészek nem állnak így elő, vagyis a keresett valószínűség  $3/4 = 75\%$ . A második kérdésnél fel kell használnunk Gauss nevezetes tételét, hogy pontosan a  $4^r(8t + 7)$  alakú számok nem állnak három négyzetszám összegeként (az, hogy ezek nem állnak elő,  $r$  szerinti teljes indukcióval egyszerűen bizonyítható, a tétel nehéz része, hogy más kivétel nincs). Vagyis rosszak a  $8t + 7, 32t + 28$  stb. egészek, ezek száma  $n$ -ig rendre  $\lfloor (n + 1)/8 \rfloor, \lfloor (n + 4)/32 \rfloor$ , és általában  $\lfloor (n + 4^r)/(8 \cdot 4^r) \rfloor$ , vagyis  $(n - f(n))/n$  „kb.” az  $1/8 + 1/32 + \dots + 1/(8 \cdot 4^r) + \dots$  végtelen mértani sor összege, azaz  $1/6$ , tehát az előállók aránya  $5/6$ .

3. Hány egymást követő természetes szám adható meg, amelyek (a) mindegyike felírható; (b) egyike sem írható fel két négyzetszám összegeként?

*Megoldás:* A két négyzetszám összegeként felírható számok is felismerhetők: pontosan azok állnak így elő, amelyek kanonikus alakjában minden  $4t + 3$  alakú prím páros kitevővel szerepel. Azonban enélkül is boldogulhatunk. Az első néhány egészt megnézve látjuk, hogy a rosszak a  $3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, \dots$ , és a gyerekek is könnyen megsejthetik, hogy rosszak pl. (i) a  $4t + 3$  alakú számok, illetve (ii) a 3 olyan többszöröse, amelyek 9-cel nem oszthatók. Ezek bizonyítása is azonnal adódik mod 4, illetve mod 3 vizsgálatával.

Rátérve (a)-ra, (i)-ből következik, hogy minden negyedik szám biztosan rossz, tehát legfeljebb 3 szomszédos szám írható fel két négyzetszám összegeként. Ennyi létezik is, pl. 8, 9, 10. Azt sem túl nehéz igazolni, hogy ez végtelen sokszor fordul elő: az 1a feladatban látottak alapján adódik, hogy az  $x^2 - 2y^2 = 1$  egyenletnek végtelen sok egész megoldása van, és így  $x^2 - 1 = y^2 + y^2, x^2 = x^2 + 0^2, x^2 + 1 = x^2 + 1^2$  mindegyike két négyzetszám összege.

Ugyanakkor akárhány egymást követő egész is megadható, amelyek mindegyike rossz. Ehhez kicsit haladóbb eszközök kellene: végtelen sok  $4t + 3$  alakú prímszám van (ez az euklideszi gondolattal simán kijön), a kínai maradéktétel, valamint az, hogy ha egy  $n$  szám osztható egy  $4t + 3$  alakú  $p$  prímszámmal, de nem osztható  $p^2$ -tel, akkor  $n$  nem írható fel két négyzetszám összegeként. Ez utóbbi abból következik, hogy ha  $p \mid a^2 + b^2$ , azaz  $a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$ , akkor ezt a kongruenciát  $(p - 1)/2 = 2t + 1$ -edik hatványra emelve  $a^{p-1} \equiv -b^{p-1} \pmod{p}$  adódik, ami a kis Fermat-tétel miatt csak úgy lehetséges, ha  $p \mid a$  és  $p \mid b$ , de ekkor  $p^2 \mid a^2 + b^2 = n$ . Legyenek most  $p_1, p_2, \dots, p_r$  tetszőleges (különböző)  $4t + 3$  alakú prímszámok. Ha  $s + i$  osztható  $p_i$ -vel, de nem osztható  $p_i^2$ -tel, akkor  $s + 1, \dots, s + r$  mindegyike rossz. Ilyen  $s$ -et pl. az  $x + i \equiv p_i \pmod{p_i^2}, i = 1, 2, \dots, r$  szimultán kongruenciarendszer megoldásaként kapunk. Mivel a modulusok páronként relatív prímek, így a kínai maradéktétel szerint van megoldás.

4. Átlagosan hányféleképp áll elő egy szám két négyzetszám összegeként?

*Megoldás:* Legyen  $r(n)$  az  $n = x^2 + y^2$  egyenlet  $0 \leq y \leq x$  egész megoldásainak a száma, ekkor a  $\lim_{n \rightarrow \infty} [r(1) + r(2) + \dots + r(n)]/n$  határértéket kell kiszámítani. Itt egyáltalán nem segít, ha tudjuk  $r(n)$  képletét. Az egész koordinátájú pontok négyzetrácsát érdemes nézni, itt  $r(1) + \dots + r(n)$  az  $x^2 + y^2 \leq n$  megoldásszáma, ami (a  $0 \leq y \leq x$  feltétel mellett) éppen egy origó körüli  $\sqrt{n}$  sugarú nyolcadkör rácspontjainak a száma (az origót leszámítva). Ha minden rácspont köré egy egységnyelvet rajzolunk, amelynek ő a középpontja, akkor ezek az egységnyelvetek nagyjából a nyolcadkört fedik le, azaz a rácspontok száma nagyjából a nyolcadkör területe, vagyis  $(\sqrt{n})^2 \pi/8$ . Így a keresett határérték  $\pi/8$ , azaz átlagosan ennyiféleképpen írható fel egy pozitív egész két négyzetszám összegeként.

5. Lehet-e (a) 2; (b) 3; (c) 4 egymást követő pozitív egész szorzata négyzetszám?

*Megoldás:* (a) Nem lehet, hiszen  $x^2 < x^2 + x < (x+1)^2$ . Másképp: ha  $x(x+1) = y^2$ , akkor  $(x, x+1) = 1$  miatt  $x = a^2$ ,  $y = b^2$ , de két pozitív négyzetszám különbsége nem lehet 1. (A második gondolatmenetből az is adódik, hogy  $x(x+1)$  semmilyen teljes hatvány sem lehet.)

(b) Nem lehet:  $y^2 = x(x-1)(x+1) = x(x^2-1)$ ; mivel  $(x, x^2-1) = 1$ , ezért külön-külön is négyzetszámok, de  $x^2 - 1 \neq z^2$ .

(c) Ez sem lehet:  $y^2 = x(x+1)(x+2)(x+3)$ ; legyen  $u = x(x+3)$ , ekkor  $y^2 = u(u+2)$ . Ha  $u$  páratlan, akkor  $(u, u+2) = 1$ , tehát  $u = a^2$ ,  $u+2 = b^2$ , és így  $b^2 - a^2 = 2$ , ami nem lehet. Ha  $u = 2v$ , akkor  $(y/2)^2 = v(v+1)$ , ami az (a) rész alapján lehetetlen.

*Megjegyzés:* Általában is igaz, hogy egymást követő pozitív egészek szorzata sohasem lehet teljes hatvány, ezt a hosszú ideig megoldatlan sejtést Erdős és Selfridge bizonyították be 1975-ben.

6. Adjuk meg pozitív egészek olyan végtelen sorozatát, hogy semelyik két tag (a) összege; (b) különbsége se legyen négyzetszám. Próbáljunk minél sűrűbb ilyen sorozatokat konstruálni.

*Megoldás:* (a) A  $3t + 1$  alakú számok megfelelnek, ezek sűrűsége  $1/3$ . Sokáig azt hitték, hogy ez a legjobb, de kiderült, hogy a  $4t + 1$  alakú számokat, valamint mod 32 a 14, 26 és 30 maradékosztályokat véve egy  $11/32$  sűrűségű jó sorozatot kapunk (egy páratlan négyzetszám mod 8 maradéka 1, egy párosé mod 32 pedig 0, 4 vagy 16, és a fenti halmaz két elemét összeadva sohasem kapunk ilyen maradékot). Hosszú évek bizonytalansága után végül Szemerédi Endre igazolta, hogy ennél sűrűbb sorozat már nem létezik.

(b) Itt messze nincs meg a pontos válasz. Először nézzük, mire jutunk a mohó algoritmussal. Ez azt jelenti, hogy minden lépésben a lehető legkisebb számot vesszük hozzá az addig kiválasztottakhoz. Az  $1, 2, \dots, n$  számok közül így  $a_1 = 1$ , ekkor nem vehető  $a_1 + 1 = 2$ ,  $a_1 + 4 = 5, \dots$ , tehát  $a_2 = 3$ , így nem vehető  $a_2 + 1 = 4$ ,  $a_2 + 4 = 7, \dots$ , vagyis  $a_3 = 6$  stb. Ha  $a_1, \dots, a_r$ -et kiválasztottuk, akkor ezek mindegyike az  $a_i + h^2$ ,  $h \leq \sqrt{n - a_i}$  számokat tiltja le, azaz összesen legfeljebb  $r\sqrt{n}$  szám foglalt. Ez azt jelenti, hogy  $r < \sqrt{n}$  esetén biztosan találunk újabb,  $n$ -nél kisebb szabad elemet, így  $n$ -ig mindenképpen ki tudunk választani legalább  $\sqrt{n}$  elemet.

Ezt a sűrűséget sokáig csak nagyon nehéz eszközök bevetésével sikerült egy icipicit javítani, míg Ruzsa Imre meg nem találta az alábbi abszolút középiskolás konstrukciót: tekintsük azokat a számokat, amelyek 5-ös számrendszerbeli alakjában a hátulról számított

páratlan helyi értékeken csak 0 vagy 2 számjegy állhat. Az  $n$ -nél kisebb ilyen számoknak kb.  $\log_5 n$  számjegye van (az elején is megengedve 0-kat), ezek fele 5-féle lehet, a másik fele 2-féle, vagyis a számuk kb.  $5^{(\log_5 n)/2} \cdot 2^{(\log_5 n)/2} = n^{(1/2)(1+\log_5 2)} = n^{0.71\dots}$ . Meg kell még mutatnunk, hogy ez jó sorozat. Legyen  $c = c_0 + 5c_1 + 5^2c_2 + \dots$  és  $d = d_0 + 5d_1 + 5^2d_2 + \dots$  két ilyen szám, és tegyük fel, hogy  $m^2 = c - d = (c_0 - d_0) + 5(c_1 - d_1) + \dots$ . Ezt mod 5 nézve egyrészt  $c - d \equiv c_0 - d_0 \equiv 0, 2$  vagy  $3$ , másrészt egy négyzetszám 5-ös maradéka 0, 1 vagy 4. Ezért  $c - d \equiv 0 \pmod{5}$ , tehát  $5 \mid c - d = m^2$ , innen  $25 \mid c - d$ , vagyis  $c$  és  $d$  utolsó két jegye megegyezik. Mindkét számból ezt a részt kivonva és 25-tel osztva  $(c - d)/25 = (c_2 - d_2) + 5(c_3 - d_3) + \dots = (m/5)^2$  adódik. Az előző gondolatmenetet megismételve, majd az eljárást folytatva kapjuk, hogy minden  $i$ -re  $c_i = d_i$ , tehát  $c = d$ .

- 7.** Van-e végtelen sok olyan háromtagú számtani sorozat, amelynek az elemei relatív prím négyzetszámok?

*Megoldás:* Van, sőt olyan is, ahol az első tag 1: az  $1 + v^2 = 2u^2$  Pell-egyenletről az 1a feladatban megmutattuk, hogy végtelen sok megoldása van. Az összes számhármast a következőképpen kaphatjuk meg:  $r^2 + s^2 = 2t^2 \iff [(r+s)/2]^2 + [(r-s)/2]^2 = t^2$ , amivel a feladatot a pitagoraszi számhármásokra vezettük vissza, amelyeknek jól ismert a paraméteres előállítás.

- 8.** Mely számrendszerekben lesz az (a) 3; (b) 5; (c) 33 darab 1-esből álló szám négyzetszám?

*Megoldás:* (a) Nincs ilyen:  $x^2 < x^2 + x + 1 < (x+1)^2$ .

(b) Itt is megpróbáljuk  $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ -et két négyzetszám közé beszorítani:  $z^2 = (x^2 + x/2 + 3/8)^2 = f(x) - 5x/8 - 55/64 < f(x)$  és  $(z + 1/8)^2 = (x^2 + x/2 + 4/8)^2 = f(x) + x^2/4 - x/2 - 3/4 > f(x)$ , ha  $x > 3$ . Ha  $f(x)$  négyzetszám, akkor egyben egy 8 nevezőjű törtnek a négyzete, viszont  $x > 3$  esetén két egymást követő ilyen tört négyzete közé esik. Ezért csak  $x = 2$  vagy  $3$  jöhet szóba, amelyek közül  $x = 3$  valóban megfelel:  $1+3+9+27+81 = 11^2$ . (Dolgozhatunk végig egészekkel is; ehhez az egyenletet  $64 = 8^2$ -tel be kell szorozni.)

(c)  $t^2 = 1 + x + \dots + x^{32} = (1 + x + x^2)(1 + x^3 + x^6 + \dots + x^{30})$ . Megmutatjuk, hogy a két tényező relatív prím; ebből következik, hogy külön-külön is négyzetszámok, de 8a-ban beláttuk, hogy az első tényező nem lehet az, vagyis nincs megoldás. Tegyük fel, hogy a két tényezőnek  $p$  közös prímosztója. Ekkor  $p \mid x^2 + x + 1 \mid x^3 - 1$ , azaz  $x^3 \equiv 1 \pmod{p}$ , és így a második tényező 11 maradékot ad  $p$ -vel osztva, tehát csak  $p = 11$  lehet. Azonban az  $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{11}$  kongruencia nem oldható meg, ezt pl. a  $0, 1, \dots, 10$  értékek végigpróbálásával vagy pedig a 4-gyel való beszorzás után kapott  $(2x+1)^2 \equiv -3 \pmod{11}$  megoldhatatlanságával igazolhatjuk.

- 9.** Adott 11 (különböző) pozitív egész, amelyek egyikének sincs 30-nál nagyobb prímosztója. Bizonyítsuk be, hogy a számok közül kiválasztható néhány (lehet, hogy csak egy, lehet, hogy az összes), amelyek szorzata négyzetszám.

*Megoldás:* Tekintsük a számokból képezhető  $2^{11} - 1$  szorzat kanonikus alakját, ezekben a 30-nál kisebb 10 prímszám hatványai szerepelnek. A négyzetszámok szempontjából csak a kitevők paritása számít, így ezekre  $2^{10}$  különböző lehetőség van. A skatulyaelv miatt lesz két olyan szorzat, amelyben a prímelek kitevőinek paritása páronként egyforma, pl.  $a_1 a_2 a_3$

és  $a_2a_4$ . Ezt a két szorzatot összeszorozva négyzetszámot kapunk, és ha elhagyjuk a duplán előforduló tényezőket, akkor a megmaradó csupa különböző tényező szorzata továbbra is négyzetszám marad (a példánkban ez  $a_1a_2a_3a_2a_4/(a_2)^2 = a_1a_3a_4$ ).

Egy másik megoldás a következő. Mindegyik  $a_i$  számnak feleltessük meg a benne szereplő prímek kitevőinek 10 elemű  $A_i = (k_{i,1}, \dots, k_{i,10})$  paritásvektorát, ahol  $k_{i,j}$  aszerint 0 vagy 1, hogy  $a_i$ -ben a  $j$ -edik prím kitevője páros vagy páratlan. Egy szorzat pontosan akkor négyzetszám, ha a megfelelő vektorok összege a nullvektor. Ha a vektorokat a modulo 2 test feletti 10-dimenziós vektortér elemeinek tekintjük, akkor a 11 vektor biztosan lineárisan összefüggő, azaz (mivel a skaláregyűthetők csak 0 és 1 lehetnek) néhány vektor összege a nullvektor.

*Megjegyzés:* A második bizonyítás fölösleges nagyágyúnak tűnik, azonban jelentős előnye, hogy a kérdést egy homogén lineáris egyenletrendszer megoldására visszavezetve gyors algoritmust ad megfelelő szorzat megtalálására, míg az első bizonyítás csak azt adja, hogy a rengeteg eset végigpróbálásával biztosan célhoz érünk. A feladat (10/11 helyett nagyobb számokra) fontos szerepet játszik (viszonylag hatékony) prímfelbontási algoritmusok konstruálásában. A probléma magasabb kitevőjű hatványokra történő általánosítása csak részben megoldott és másfajta matematikai eszközöket igényel. (Mindezekről részletesebben lásd pl. a Freud Lineáris algebra könyv 9.3 pontját.)

**10.** Milyen  $n$ -ekre igaz, hogy  $n$  darab alkalmas (nem feltétlenül egybevágó) négyzetből, mindegyiket felhasználva, hézagtalanul kirakható egy (nagyobb) négyzet? És mi a helyzet a térben, ha ugyanezt kockákra kérdezzük?

*Megoldás:* Érdemesebb fordítva okoskodni, hogy egy nagy négyzetet hány kis négyzetre vághatunk szét. Ha  $k$  részre ez megoldható, akkor az egyik négyzetet négyfelé vágva  $k+3$ -ra is kapunk egy jó felbontást, így  $n = 1, 4, 7, \dots$  biztosan elérhető. Ha a négyzetet  $t^2$  egybevágó kis négyzetre vágjuk, és  $(t-1)^2$  kis négyzetet egyesítünk egy (közepes) négyzetté, akkor az eredeti négyzetünk  $t^2 - (t-1)^2 + 1 = 2t$  négyzet egyesítése, azaz  $n = 6, 8, 10, \dots$  is jó. Ezeket 3-mal növelve kapjuk, hogy minden  $n \neq 2, 3, 5$  megfelel. A 2 és a 3 nyilván nem jó, mert az eredeti négyzet mind a 4 sarkába kell egy négyzet, és könnyen belátható az is, hogy az 5 sem jó.

Rátérve a kockákra, itt minden él felezésével azt kapjuk, hogy ha  $k$  jó, akkor  $k+7$  is, a harmadolással pedig azt, hogy  $k+26$  is. Így biztosan jó minden  $n = 1 + 7r + 26s$  alakú szám, ahol  $r$  és  $s$  nemnegatív egészek. Mivel  $(7, 26) = 1$ , ezért  $0 \cdot 26, 1 \cdot 26, 2 \cdot 26, \dots, 6 \cdot 26$  mind különböző maradékot adnak 7-tel osztva, így  $n-1 \geq 6 \cdot 26 - 6 = 150$  esetén  $n$  biztosan előáll ilyen alakban. A fenti módszer persze finomítható, például ha az élek harmadolása után keletkező 27 kis kockából 8-at összeragasztunk, akkor 26 helyett 19 a növekedés, vagy az élnegyedelés után a 64 kis kockából 27-et egyesítve 37 a növekmény stb. Ilyen trükkökkel megmutatható, hogy minden  $n > 47$  megfelel, azonban megoldatlan, hogy pl. 47-re mi a helyzet.

*Megjegyzés:* Ha  $a_1, \dots, a_k$  pozitív, relatív prím egészek, akkor az  $a_1x_1 + \dots + a_kx_k = n$  diofantikus egyenletnek minden, az  $a_i$ -ktől függően elég nagy  $n$  esetén létezik  $x_i \geq 0$  megoldása, azonban  $k > 2$ -re nem ismert a küszöbértékre általános használható képlet. Ezt az ún. Frobenius-problémát sokat és intenzíven vizsgálták (köztük Erdős is), a témáról Kiss Géza írt feladatokat is tartalmazó nagyon jó áttekintő cikket (Teaching Mathematics and Computer Science 1/2 (2003), 203–218).