

---

# Szoldatics József

## Rekurzió

57. RÁTZ LÁSZLÓ VÁNDORGYŰLÉS  
SZÉKESFEHÉRVÁR  
2017. JÚLIUS 4-7.

2017. szeptember 1.

---

# Tartalomjegyzék

<b>1. Előadás</b>	<b>2</b>
1.1. Másodrendű, homogén megoldása . . . . .	2
1.2. Megoldási módszerek . . . . .	2
1.3. Feladatok . . . . .	3
1.3.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)	3
1.3.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)	3
1.3.3. Feladatok teleszkopikus összegre . . . . .	3
1.3.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra . . . . .	4
1.3.5. Feladatok index léptetésre . . . . .	4
1.3.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére . . . . .	4
1.3.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)	4
1.4. Feladatok forrásai . . . . .	6
<b>2. Végeredmények</b>	<b>7</b>
2.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)	7
2.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)	7
2.3. Feladatok teleszkopikus összegre . . . . .	7
2.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra . . . . .	7
2.5. Feladatok index léptetésre . . . . .	7
2.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére . . . . .	8
2.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)	8
<b>3. Megoldások</b>	<b>10</b>
3.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)	10
3.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)	15
3.3. Feladatok teleszkopikus összegre . . . . .	16
3.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra . . . . .	18
3.5. Feladatok index léptetésre . . . . .	20
3.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére . . . . .	23
3.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)	25
<b>4. Melléklet</b>	<b>49</b>
4.1. A feladatok megoldása során használt összefüggések . . . . .	49
4.2. „Sima” számtani sorozat rekurzív kezelése . . . . .	50
4.3. „Sima” mértani sorozat rekurzív kezelése . . . . .	50
4.4. Másodrendű, $a_n = c_1 \cdot a_{n-1} + c_2 \cdot a_{n-2}$ homogén rekurzió megoldása . . . . .	51
4.4.1. Generátor-függvény módszerrel . . . . .	51
4.4.2. Karakterisztikus egyenlettel . . . . .	51
4.5. Periodikus, $a_n = \frac{a \cdot a_{n-1} + b}{c \cdot a_{n-1} + d}$ alakú sorozatok . . . . .	53
4.5.1. Periódus hossza = 1 . . . . .	53
4.5.2. Periódus hossza = 2 . . . . .	53
4.5.3. Periódus hossza = 3 . . . . .	53
4.5.4. Periódus hossza = 4 . . . . .	54
4.5.5. Periódus hossza = 5 . . . . .	54

# 1. Előadás

Nagyon sok esetben felbukkan rekurziós összefüggés, egyenlet feladatok megoldása közben. Ezen egyenletek megoldása egy kicsit másképpen történik, mint a többi esetben. Ezeknek a megoldásához szeretnék segítséget adni.

## 1.1. Másodrendű, homogén megoldása

Röviden ismertetem a másodrendű homogén rekurzió általános megoldását:

$$a_n = \alpha a_{n-1} + \beta a_{n-2}$$

Rekurzió karakterisztikus egyenlete:

$$r^2 = \alpha r + \beta \quad \Rightarrow \quad r^2 - \alpha r - \beta = 0.$$

Ennek gyökei

$$r_1 \quad \text{és} \quad r_2,$$

A sorozat

$$a_n = C_1 \cdot r_1^{n-1} + C_2 \cdot r_2^{n-1}$$

alakban írható fel, ahol a konstansok az első és második elemből kiszámíthatók.

Például:

$$a_1 = 2; \quad a_2 = 8; \quad a_n = 8a_{n-1} - 15a_{n-2}; \quad n \geq 2$$

$$r^2 = 8r - 15 \quad \Rightarrow \quad r^2 - 8r + 15 = 0$$

$$r_1 = 3; \quad r_2 = 5$$

$$a_n = C_1 \cdot 3^{n-1} + C_2 \cdot 5^{n-1}$$

$$\begin{cases} 2 = C_1 + C_2 \\ 8 = 3C_1 + 5C_2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 1$$

Tehát a sorozat alakja

$$a_n = 3^{n-1} + 5^{n-1}$$

## 1.2. Megoldási módszerek

Tetszőleges módon, akár több úton is meg lehet oldani a feladatokat. Néhány gyakran használt módszer:

- **Teljes indukció (azaz vegyük észre ...)**  
Megpróbáljuk kitalálni a végeredményt, majd ezt teljes indukció segítségével igazoljuk.
- **Teleszkopikus összeg**  
A keresett összefüggést felírva, majd az index léptetésével 1-ig (illetve a legkisebb értékig) léptetve – esetleg megfelelő konstansokkal szorozva – összeadjuk őket.
- **Teleszkopikus szorzat**  
A keresett összefüggést felírva, majd az index léptetésével 1-ig (illetve a legkisebb értékig) léptetve – esetleg megfelelő konstansokkal szorozva – összeszorozzuk őket. Nagyon fontos ezen módszernél arról meggyőződni, hogy nincs a felírt összefüggések között nulla értékű sor.

- **Index léptetés**

Index le (esetleg fel) léptetésével és az eredeti összefüggés felhasználásával egy „keze-  
sebb” sorozat kialakítása.

- **Új sorozat (új ismeretlen) bevezetése**

Mint az elnevezés mutatja, egy „kezebb” sorozat elérése a cél.

A megoldási módszerek ezek teljes kombinációja lehet, azaz egy feladatban akár több módszer egymás utáni vagy akár egyidejű alkalmazása.

### 1.3. Feladatok

Minden feladat esetén adjuk meg a sorozat  $n$ -edik elemét  $n$  függvényében, ha csak a feladat mást nem ír elő.

#### 1.3.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)

- Hányféleképpen lehet egy 10 szintes (15; 20; ... szintes) lépcső tetejére felmenni, ha
  - egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk?
  - egyszerre 1, 2 vagy 3 lépcsőt léphetünk?
  - egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk, de két 2-est egymás után nem léphetünk?
  - egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk, de két egyformát egymás után nem léphetünk?
- Piros és kék színű üveggolyókból 10 golyó (15; 20; ... golyó) hosszúságú láncot készí-  
tünk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha
  - nem akarjuk, hogy kék golyók kerüljenek egymás mellé?
  - nem akarjuk, hogy egyforma golyókból 2-nél több kerüljön egymás mellé?
- Piros, kék és zöld színű üveggolyókból 10 golyó (15; 20; ... golyó) hosszúságú láncot  
készítünk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha
  - nem akarjuk, hogy kék golyók kerüljenek egymás mellé?
  - nem akarjuk, hogy kék és zöld kerüljön egymás mellé?

#### 1.3.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)

- $a_n = \sqrt{1 + a_{n-1}^2}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
- $a_n = \frac{a_{n-1}}{2 - a_{n-1}}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = \frac{1}{2}$
- $a_n = \frac{n-1}{n} (a_{n-1} + 1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$

#### 1.3.3. Feladatok teleszkopikus összegre

- $a_n = a_{n-1} + 5; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
- $a_n = a_{n-1} + n; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
- $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n(n-1)}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

**1.3.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra**

1.  $a_n = 3a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$
2.  $a_n = 3a_{n-1} + 2; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$
3.  $a_n = 3a_{n-1} + 1; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$

**1.3.5. Feladatok index léptetésre**

1.  $a_n = 4 + 4\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
2.  $a_n = \frac{n+1}{n-1} (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
3.  $a_n = \frac{1}{16} (1 + 4a_{n-1} + \sqrt{1 + 24a_{n-1}}); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$   
Igazoljuk, hogy a sorozat racionális számokból áll.

**1.3.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére**

1.  $a_n = 3a_{n-1} + n; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
2.  $a_n = (n-1)a_{n-1} + n^2 - 3n + 1; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$
3.  $a_n = 2a_{n-1} + 3^{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$

**1.3.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)**

1. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle 1-gyel eltérő számjegy követhet, azaz (1 → 2; 2 → 1,3; 3 → 2). Hány ilyen sorozat van?
2. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle legfeljebb 1-gyel eltérő számjegy követhet, azaz (1 → 1, 2; 2 → 1,2,3; 3 → 2, 3). Hány ilyen sorozat van?
3. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle legfeljebb 1-gyel eltérő számjegy követhet, de 2-t 2-es nem követhet, azaz (1 → 1, 2; 2 → 1,3; 3 → 2, 3). Hány ilyen sorozat van?
4. Az 1, 2 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ... hosszú) számsorozatot, de 1-es csak legalább 2db 2-es után állhat (vagy 1-es után), azaz (1 → 1, 2; 12 → 2, 22 → 1, 2). Hány ilyen sorozat van?
5. Kettes számrendszerbeli 10 (15; 20; ...) hosszú számok száma, ha 0-s csak dupla 1-es után állhat, azaz (01 → 1; 11 → 0,1; 0 → 1)

$$6. a_n = \frac{(n+1)n(n-1)}{(n+4)(n+3)(n+2)} (a_{n-1} + 1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$$

$$7. a_n = \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^2 a_{n-1} + \frac{1}{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = A$$

8.  $a_n = 1 - \frac{n-1}{n}a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

9.  $a_n = -\frac{1}{n}a_{n-1} + \frac{n-2}{n-1}a_{n-2}; \quad n \geq 3; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = \frac{1}{2}$

10.  $na_n = 2(2n-1)a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

11.  $a_n = \frac{1}{2}(3a_{n-1} + \sqrt{5a_{n-1}^2 - 4}); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

12.  $a_n = 3a_{n-1} + \sqrt{8a_{n-1}^2 - 8}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

13.  $a_n = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}(a_{n-1} + 1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$

14.  $a_n = a_{n-1} + 4\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 2 \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

15.  $a_n = \frac{2a_{n-1} - 4}{a_{n-1}} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1; \quad a_{2017} = ?$

16.  $a_n = 9 + 6\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

17.  $a_n = 25 + 10\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

18.  $a_n = \frac{a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2}{a_{n-3}}; \quad n \geq 4; \quad a_1 = a_2 = a_3 = 1;$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll:

19.  $x = \sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4x}}}}$   
 Oldjuk meg az egyenletet!

20.  $a_n = \frac{1}{1 - a_{n-1}} - \frac{1}{1 + a_{n-1}}$   
 A sorozat periodikus. Mi lehet az első elem?

21.  $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$  és  $a_1 < a_2$  pozitív egész szám.  
 Igazoljuk, hogy  $a_{45} > 3^{43}$ .

22.  $a_n = a_{n-1} - \frac{n}{(n+1)!}; \quad n \geq 2. a_1 = 2;$

23.  $a_n = \frac{a_{n-1}}{2a_{n-1} + 1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

Hány olyan tagja van a sorozatnak, amelyik nagyobb  $\frac{1}{100}$ -nál?

24.  $a_n = a_{n-1} + n^2, \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

Hány 5-tel osztható szám van a sorozat első 100 tagja között?

25.  $a_n = 3a_{n-1} + 2^n, \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

$$26. a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = 0; \quad a_2 = 1$$

$$27. a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = 3$$

$$28. a_n = a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-3}, \quad n \geq 4; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = 2; \quad a_3 = 2; \quad a_{2017} = ?$$

$$29. a_n = \frac{a_{n-1}a_{n-2}}{3a_{n-2} - 2a_{n-1}}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = \frac{1}{2}; \quad a_2 = \frac{1}{3}$$

$$30. a_n = \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = -3; \quad a_2 = 2$$

$$31. \begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3b_{n-1} \\ b_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1} \end{cases} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2; \quad b_1 = 0$$

$$32. \begin{cases} a_n = 4a_{n-1} + 2b_{n-1} \\ b_n = 5a_{n-1} - 3b_{n-1} \end{cases} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1; \quad b_1 = -1$$

$$33. na_n = (2n - 2)a_{n-1} - (n - 2)a_{n-2}; \quad n \geq 3; \quad a_1 = 5; \quad a_2 = 4$$

$$34. a_n = a_{n-1} - a_{n-1}^2; \quad n \geq 2; \quad 0 < a_1 < 1; \\ \text{Bizonyítsuk be, hogy } a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_k^2 < 1$$

$$35. \frac{a_n}{a_{n-2}} + 6 \cdot \frac{a_{n-3}}{a_{n-1}} = 5; \quad n \geq 4; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = 2; \quad a_3 = \frac{5}{2}$$

#### 1.4. Feladatok forrásai

- Arany Dániel Matematikaverseny feladatai
- Internet
- KÖMAL folyóirat feladatai
- Kvant folyóirat feladatai
- OKTV feladatai
- Orosz Gyula: Rekurzív sorozatok, Matematika Oktatási Portál (<http://matek.fazekas.hu>)
- Szoldatics József: Rekurzio, Matematika Oktatási Portál (<http://matek.fazekas.hu>)

## 2. Végeredmények

### 2.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)

1. a)  $a_{10} = 89$ ;  $a_{15} = 987$ ;  $a_{20} = 10946$   
 b)  $a_{10} = 274$ ;  $a_{15} = 5768$ ;  $a_{20} = 121415$   
 c)  $a_{10} = 41$ ;  $a_{15} = 277$ ;  $a_{20} = 1873$   
 d)  $a_{10} = 1$ ;  $a_{15} = 2$ ;  $a_{20} = 1$
2. a)  $a_{10} = 24960$ ;  $a_{15} = 3799168$ ;  $a_{20} = 1873$   
 b)  $a_{10} = 2$ ;  $a_{15} = 2$ ;  $a_{20} = 2$
3. a)  $a_{10} = 41$ ;  $a_{15} = 277$ ;  $a_{20} = 578272256$   
 b)  $a_{10} = 8119$ ;  $a_{15} = 665857$ ;  $a_{20} = 54608393$

### 2.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)

1.  $a_n = \sqrt{n}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
2.  $a_n = \frac{1}{2^{n-1} + 1}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
3.  $a_n = \frac{n-1}{2}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

### 2.3. Feladatok teleszkopikus összegre

1.  $a_n = 5n - 4$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
2.  $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
3.  $a_n = \frac{2n-1}{n}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

### 2.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra

1.  $a_n = 3^{n-1}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
2.  $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
3.  $a_n = \frac{3^n - 1}{2}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

### 2.5. Feladatok index léptetésre

1.  $a_1 = 1$ ;  $a_n = 8(n-1)$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$ ;  $n \geq 2$
2.  $a_n = (n+1) \cdot 2^{n-2}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$
3.  $a_n = \frac{\left[3 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]^2 - 1}{24}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$



## 2.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére

$$1. a_n = \frac{3^{n+1} - 2n - 3}{4}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$2. a_n = 2 \cdot n! - n; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$3. a_n = 3^n - 2^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

## 2.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)

$$1. a_{10} = 64; a_{15} = 384; a_{20} = 2048$$

$$2. a_{10} = 8119; a_{15} = 665857; a_{20} = 54608393$$

$$3. a_{10} = 1536; a_{15} = 49152; a_{20} = 1572846$$

$$4. a_{10} = 465; a_{15} = 7739; a_{20} = 128801$$

$$5. a_{10} = 28; a_{15} = 189; a_{20} = 1278$$

$$6. a_n = \frac{(n-1)n}{10(n+2)}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$7. a_1 = A; a_n = \frac{n}{2(n-1)}; \quad n \geq 2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$8. a_n = \begin{cases} \frac{k}{2k-1} & n = 2k-1 \\ \frac{1}{2} & n = 2k \end{cases} \quad n; k \in \mathbb{N}^+$$

$$9. a_n = \frac{1}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$10. a_n = 2^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!} = \binom{2n}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$11. a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}; \quad n \geq 2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$12. a_n = 6a_{n-1} - a_{n-2}; \quad n \geq 2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$13. a_n = \frac{(n-1)(2n+1)}{10(n+1)}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$14. a_n = 2n^2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$15. a_{2017} = a_1 = 1$$

$$16. a_n = 18n - 3; \quad n \geq 2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$17. a_n = 50n - 65; \quad n \geq 3; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$18. a_n = 3a_{n-1}a_{n-2} - a_{n-3}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$19. x = 1 \text{ vagy } x = 3$$

20.  $a_1 = \operatorname{tg} \left( \frac{k}{2^{n-1} - 1} \pi \right); \quad n \in \mathbb{N}^+$
21.  $a_n = 3^{n-2} (a_2 - a_1) + a_{n-1} > 3^{n-2} \cdot 1 + 0 = 3^{n-2}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
22.  $a_n = \frac{3}{2} + \frac{1}{(n+1)!}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
23. Az első 50 elemre teljesük a feltétel.
24. 60 ilyen szám van.
25.  $a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
26.  $a_n = \frac{3^{n-1} - (-2)^{n-1}}{5}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
27.  $a_n = \frac{1-2i}{2} (1+i)^{n-1} + \frac{1+2i}{2} (1-i)^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
28.  $a_{2017} = a_1 = 1$
29.  $a_n = \frac{1}{2^{n-1} + 1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
30.  $a_n = -3 \cdot \left( -\frac{2}{3} \right)^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
31.  $a_n = (-1)^{n-1} + 5^{n-1}; \quad b_n = 5^{n-1} - (-1)^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
32.  $a_n = \left( \frac{89 + 3\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 + \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1} + \left( \frac{89 - 3\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 - \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1}$   
 $b_n = \left( \frac{-89 + 17\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 + \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1} + \left( \frac{-89 - 17\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 - \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1}$   
 $n \in \mathbb{N}^+$
33.  $a_n = \frac{3n+2}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+$
34.  $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2 = a_1 - a_{k+1} < 1; \quad k \in \mathbb{N}^+$
35.  $a_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2 & n = 2 \\ \frac{(1+1)(2^2+3^2)\dots(2^{2k-2}+3^{2k-2})}{(2+3)(2^3+3^3)\dots(2^{2k-3}+3^{2k-3})} & n = 2k; k \geq 2 \\ \frac{(2+3)(2^3+3^3)\dots(2^{2k-1}+3^{2k-1})}{(1+1)(2^2+3^2)\dots(2^{2k-2}+3^{2k-2})} & n = 2k+1; k \geq 1 \end{cases}$

### 3. Megoldások

A feladatoknak csak 1 megoldását írtam le. Természetesen – sok esetben – akár több megoldás is létezik.

A feladatoknál megjelöltem a feladatok – általam ismert – származási helyét. amennyiben nincs megjelölés, az vagy  
 – a „matematikai folklór” része, eredete ismeretlen  
 – nem tudom a feladat származási helyét.

#### 3.1. Feladatok rejtett rekurzióra (feladatok alacsonyabb korosztály számára)

- Hányféleképpen lehet egy 10 szintes (15; 20; ... szintes) lépcső tetejére felmenni, ha a) egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk?

.....  
 Klasszikus felírás:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
Összes		1	2	3	5	...	89	...	987	...	10946

Módosított felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Lépcső	...	$n - 2$	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-2}$	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-2}$	$b_{n-1}$	$b_n$
Összes	...	$s_{n-2}$	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	1	2	3	5	...	55	...	610	...	6765
2	0	1	1	2	3	...	34	...	377	...	4181
Összes	1	2	3	5	8	...	89	...	987	...	10946

$$\text{Lépcső}(n - 2) + \text{Lépcső}(n - 1) = \text{Lépcső}(n) = \text{Fibonacci}(n + 1)$$

- egyszerre 1, 2 vagy 3 lépcsőt léphetünk?

.....  
 Klasszikus felírás:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
Összes	1	2	4	7	13	...	274	...	5768	...	121415

Módosított felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Lépcső	...	$n - 3$	$n - 2$	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-3}$	$a_{n-2}$	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-3}$	$b_{n-2}$	$b_{n-1}$	$b_n$
3	...	$c_{n-3}$	$c_{n-2}$	$c_{n-1}$	$c_n$
Összes	...	$s_{n-3}$	$s_{n-2}$	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	1	2	4	7	...	149	...	3136	...	66012
2	0	1	1	2	4	...	81	...	1705	...	35890
3	0	0	1	1	2	...	44	...	927	...	19513
Összes	1	2	4	7	13	...	274	...	5768	...	121415

$$\text{Lépcső}(n - 3) + \text{Lépcső}(n - 2) + \text{Lépcső}(n - 1) = \text{Lépcső}(n)$$

c) egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk, de két 2-est egymás után nem léphetünk?

(Feladat: Szoldatics József)

.....

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Lépcső	...	$n - 2$	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-2}$	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-2}$	$b_{n-1}$	$b_n$
Összes	...	$s_{n-2}$	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	1	2	3	4	...	28	...	189	...	1278
2	0	1	1	1	2	...	13	...	88	...	595
Összes	1	2	3	4	6	...	41	...	277	...	1873

$$\text{Lépcső}(n - 3) + \text{Lépcső}(n - 1) = \text{Lépcső}(n)$$

d) egyszerre 1 vagy 2 lépcsőt léphetünk, de két egyformát egymás után nem léphetünk?

(Feladat: Szoldatics József)

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Lépcső	...	$n - 2$	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-2}$	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-2}$	$b_{n-1}$	$b_n$
Összes	...	$s_{n-2}$	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Lépcső	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	0	1	1	0	...	1	...	1	...	0
2	0	1	1	0	1	...	0	...	1	...	1
Összes	1	1	2	1	1	...	1	...	2	...	1

$$\text{Lepcső}(n) \begin{cases} 2 & n = 3k \\ 1 & n = 3k + 1 \\ 1 & n = 3k + 2 \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^+$$

2. Piros és kék színű üveggolyókból 10 golyó (15; 20; ... golyó) hosszúságú láncot készítünk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha

(Feladat: Szoldatics József)

- a) nem akarjuk, hogy kék golyók kerüljenek egymás mellé?

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Darab	...	$n - 2$	$n - 1$	$n$
Piros	...	$a_{n-2}$	$a_{n-1}$	$a_n$
Kék	...	$b_{n-2}$	$b_{n-1}$	$b_n$
Összes	...	$s_{n-2}$	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
Piros	1	1	2	3	4	...	28	...	189	...	1278
Kék	0	1	1	1	2	...	13	...	88	...	595
Összes	1	2	3	4	6	...	41	...	277	...	1873

$$\text{Darab}(n - 3) + \text{Darab}(n - 1) = \text{Darab}(n)$$

b) nem akarjuk, hogy egyforma golyókból 2-nél több kerüljön egymás mellé?

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Darab	...	$n - 1$	$n$
PP	...	$a_{n-1}$	$a_n$
PK	...	$b_{n-1}$	$b_n$
KK	...	$c_{n-1}$	$c_n$
KP	...	$d_{n-1}$	$d_n$
Összes		$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva:

Darab	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
PP	1	1	2	3	...	34	...	377	...	4181
PK	1	2	3	5	...	55	...	610	...	6765
KK	1	1	2	3	...	34	...	377	...	4181
KP	1	2	3	5	...	55	...	610	...	6765
Összes	4	6	10	16	...	178	...	1974	...	21892

$$\text{Darab}(n - 2) + \text{Darab}(n - 1) = \text{Darab}(n) = 2 \cdot \text{Fibonacci}(n - 1)$$

3. Piros, kék és zöld színű üveggolyókból 10 golyó (15; 20; ... golyó) hosszúságú láncot készítünk. Hányféleképpen tehetjük ezt meg, ha

(Feladat: Szoldatics József)

a) nem akarjuk, hogy kék golyók kerüljenek egymás mellé?

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Darab	...	$n - 1$	$n$
Piros	...	$a_{n-1}$	$a_n$
Kék	...	$b_{n-1}$	$b_n$
Zöld	...	$c_{n-1}$	$s_n$
Összes	...	$s_{n-1}$	

Ezt végigfuttatva:

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
Piros	1	3	8	22	60	...	9136	...	1390592	...	211662336
Kék	1	2	6	16	44	...	6688	...	1017984	...	154947584
Zöld	1	3	8	22	60	...	9136	...	1390592	...	211662336
Összes	3	8	22	60	164	...	24960	...	3799168	...	578272256

$$2 \cdot \text{Darab}(n - 2) + 2 \cdot \text{Darab}(n - 1) = \text{Darab}(m)$$

b) nem akarjuk, hogy kék és zöld kerüljön egymás mellé?

.....

Felírás, ahol a nyilak mutatják, hogy melyik fokra honnan lehet lépni:

Darab	...	$n - 1$	$n$
Piros	...	$a_{n-1}$	$a_n$
Kék	...	$b_{n-1}$	$b_n$
Zöld	...	$c_{n-1}$	$s_n$
Összes	...	$s_{n-1}$	

Ezt végigfuttatva:

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
Piros	1	3	7	17	41	...	3363	...	275807	...	22919537
Kék	1	2	5	12	29	...	2378	...	195025	...	15994428
Zöld	1	2	5	12	29	...	2378	...	195025	...	15994428
Összes	3	7	17	41	99	...	8119	...	665857	...	54608393

$$\text{Darab}(n - 2) + 2\text{Darab}(n - 1) = \text{Darab}(m)$$

### 3.2. Feladatok indukcióra (azaz vegyük észre ...)

$$1. a_n = \sqrt{1 + a_{n-1}^2}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

(Feladat: Orosz Gyula)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1 = \sqrt{1}$ ;  $a_2 = \sqrt{2}$ ;  $a_3 = \sqrt{3}$ ;  $a_4 = 2 = \sqrt{3}$ ;  $a_5 = \sqrt{5}$

Sejtés:  $a_n = \sqrt{n}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

Az indukciós lépést végrehajtva

$$a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n^2} = \sqrt{1 + (\sqrt{n})^2} = \sqrt{1 + n}$$

$$2. a_n = \frac{a_{n-1}}{2 - a_{n-1}}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = \frac{1}{2}$$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$ ;  $a_2 = \frac{1}{3} = \frac{1}{2+1}$ ;  $a_3 = \frac{1}{5} = \frac{1}{4+1}$ ;  $a_4 = \frac{1}{9} = \frac{1}{8+1}$ ;  $a_5 = \frac{1}{17} = \frac{1}{16+1}$

Sejtés:  $a_n = \frac{1}{2^{n-1} + 1}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

Az indukciós lépést végrehajtva

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2 - a_n} = \frac{\frac{1}{2^{n-1} + 1}}{2 - \frac{1}{2^{n-1} + 1}} = \frac{1}{2(2^{n-1} + 1) - 1} = \frac{1}{2^n + 1}$$

$$3. a_n = \frac{n-1}{n} (a_{n-1} + 1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 0 = \frac{0}{2}$ ;  $a_2 = \frac{1}{2}$ ;  $a_3 = 1 = \frac{2}{2}$ ;  $a_4 = \frac{3}{2}$ ;  $a_5 = 2 = \frac{4}{2}$

Sejtés:  $a_n = \frac{n-1}{2}$ ;  $n \in \mathbb{N}^+$

Az indukciós lépést végrehajtva

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+1} (a_n + 1) = \frac{n}{n+1} \left( \frac{n-1}{2} + 1 \right) = \frac{n}{n+1} \left( \frac{n+1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$



### 3.3. Feladatok teleszkopikus összegre

1.  $a_n = a_{n-1} + 5; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 6; a_3 = 11; a_4 = 16; a_5 = 21$   
 Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + 5 \\ a_{n-1} &= a_{n-2} + 5 \\ &\dots \\ a_3 &= a_2 + 5 \\ a_2 &= a_1 + 5 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + 5(n-1) \\ a_n &= 1 + 5(n-1) \\ a_n &= 5n - 4; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

#### Megjegyzés

Ez a „jól ismert” számtani sorozat.

---

2.  $a_n = a_{n-1} + n; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 3; a_3 = 6; a_4 = 10; a_5 = 15$   
 Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + (n) \\ a_{n-1} &= a_{n-2} + (n-1) \\ &\dots \\ a_3 &= a_2 + 3 \\ a_2 &= a_1 + 2 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + 2 + \dots + n \\ a_n &= 1 + 2 + \dots + n \\ a_n &= \frac{n(n+1)}{2}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$


---

3.  $a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n(n-1)}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

---

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = \frac{3}{2}$ ;  $a_3 = \frac{5}{3}$ ;  $a_4 = \frac{7}{4}$ ;  $a_5 = \frac{9}{5}$   
Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n(n-1)} = a_{n-1} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n};$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\ a_{n-1} &= a_{n-2} + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \\ &\dots \\ a_3 &= a_2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \\ a_2 &= a_1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{n} \\ a_n &= 2 - \frac{1}{n} \\ a_n &= \frac{2n-1}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

---

### 3.4. Feladatok teleszkopikus szorzatra

$$1. a_n = 3a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$$

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 3; a_3 = 9; a_4 = 27; a_5 = 81$   
 Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= 3a_{n-1} \\ a_{n-1} &= 3a_{n-2} \\ &\dots \\ a_3 &= 3a_2 \\ a_2 &= 3a_1 \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \cdot 3^{n-1} \\ a_n &= 1 \cdot 3^{n-1} \\ a_n &= 3^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

#### Megjegyzés

Ez a „jól ismert” mértani sorozat.

---

$$2. a_n = 3a_{n-1} + 2; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$$

(Feladat: Szoldatics József)

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 5; a_3 = 17; a_4 = 53; a_5 = 161$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n + 1 = 3(a_{n-1} + 1)$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n + 1 &= 3(a_{n-1} + 1) \\ a_{n-1} + 1 &= 3(a_{n-2} + 1) \\ &\dots \\ a_3 + 1 &= 3(a_2 + 1) \\ a_2 + 1 &= 3(a_1 + 1) \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n + 1 &= (a_1 + 1) \cdot 3^{n-1} \\ a_n + 1 &= 2 \cdot 3^{n-1} \\ a_n &= 2 \cdot 3^{n-1} - 1; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

$$3. \quad a_n = 3a_{n-1} + 1; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1;$$

(Feladat: Szoldatics József)

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 4; a_3 = 13; a_4 = 40; a_5 = 121$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n + \frac{1}{2} = 3 \left( a_{n-1} + \frac{1}{2} \right)$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n + \frac{1}{2} &= 3 \left( a_{n-1} + \frac{1}{2} \right) \\ a_{n-1} + \frac{1}{2} &= 3 \left( a_{n-2} + \frac{1}{2} \right) \\ &\dots \\ a_3 + \frac{1}{2} &= 3 \left( a_2 + \frac{1}{2} \right) \\ a_2 + \frac{1}{2} &= 3 \left( a_1 + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n + \frac{1}{2} &= \left( a_1 + \frac{1}{2} \right) \cdot 3^{n-1} \\ a_n + \frac{1}{2} &= \frac{3}{2} \cdot 3^{n-1} \\ a_n &= \frac{1}{2} \cdot 3^n - \frac{1}{2} \\ a_n &= \frac{3^n - 1}{2}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

### 3.5. Feladatok index léptetésre

$$1. a_n = 4 + 4\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 1; a_3 = 8; a_4 = 24; a_5 = 32$   
Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= 4 + 4\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}} \\ a_{n-1} &= 4 + 4\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2}} \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_{n-1} - 4}{4}\right)^2 &= a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2} \\ a_n &= 4 + 4\sqrt{\left(\frac{a_{n-1} - 4}{4}\right)^2 + a_{n-1}} \\ a_n &= 4 + 4\sqrt{\left(\frac{a_{n-1} + 4}{4}\right)^2} \\ a_n &= a_{n-1} + 8; \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

Ez pedig egy „sima” számtani sorozat

$$a_1 = 1; \quad a_n = 8(n - 1); \quad n \geq 2$$

$$2. a_n = \frac{n+1}{n-1}(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

(Feladat: KÖMAL 1998/október Gy.3225)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 3; a_3 = 8; a_4 = 20; a_5 = 96$   
Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n+1}{n-1}(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) \\ a_{n-1} &= \frac{n}{n-2}(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2}) \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} \frac{n-2}{n}a_{n-1} &= a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2} \\ a_n &= \frac{n+1}{n-1} \left( \frac{n-2}{n}a_{n-1} + a_{n-1} \right) \\ a_n &= \frac{n+1}{n-1} \cdot \frac{2n-2}{n}a_{n-1} \end{aligned}$$

$$a_n = 2 \cdot \frac{n+1}{n} a_{n-1}; \quad n \geq 3$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \cdot \frac{n+1}{n} a_{n-1} \\ a_{n-1} &= 2 \cdot \frac{n}{n-1} a_{n-2} \\ &\dots \\ a_3 &= 2 \cdot \frac{4}{3} a_2 \\ a_2 &= 2 \cdot \frac{3}{2} a_1 \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= 2^{n-1} \frac{n+1}{2} a_1 \\ a_n &= (n+1) \cdot 2^{n-2}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

3.  $a_n = \frac{1}{16} (1 + 4a_{n-1} + \sqrt{1 + 24a_{n-1}}); \quad n \geq 2, a_1 = 1$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat racionális számokból áll.

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = \frac{5}{8}; a_3 = \frac{9}{32}; a_4 = \frac{51}{128}; a_5 = \frac{187}{512}$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{16} (1 + 4a_{n-1} + \sqrt{1 + 24a_{n-1}}) \\ 16a_n &= 1 + 4a_{n-1} + \sqrt{1 + 24a_{n-1}} \\ 96a_n &= 6 + 24a_{n-1} + 6\sqrt{1 + 24a_{n-1}} \\ 4 + 96a_n &= 1 + 24a_{n-1} + 6\sqrt{1 + 24a_{n-1}} + 9 \\ 4(1 + 24a_n) &= (\sqrt{1 + 24a_{n-1}} + 3)^2 \\ 2\sqrt{1 + 24a_n} &= \sqrt{1 + 24a_{n-1}} + 3 \\ \sqrt{1 + 24a_n} &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1 + 24a_{n-1}} \end{aligned}$$

Ez pedig az állítást bizonyítja, hiszen ha  $a_{n-1}$  és  $\sqrt{1 + 24a_{n-1}}$  is racionális, akkor  $a_n$  és  $\sqrt{1 + 24a_n}$  is az lesz, tehát ha  $a_n$  racionális, akkor  $a_{n+1}$  is az.

### Megjegyzés

A sorozat zárt alakját is meghatározhatjuk

$$\sqrt{1 + 24a_n} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1 + 24a_{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
2\sqrt{1+24a_n} &= \sqrt{1+24a_{n-1}} + 3 \\
2\sqrt{1+24a_n} - 6 &= \sqrt{1+24a_{n-1}} - 3 \\
2(\sqrt{1+24a_n} - 3) &= \sqrt{1+24a_{n-1}} - 3
\end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned}
2(\sqrt{1+24a_n} - 3) &= \sqrt{1+24a_{n-1}} - 3 \\
2(\sqrt{1+24a_{n-1}} - 3) &= \sqrt{1+24a_{n-2}} - 3 \\
&\dots \\
2(\sqrt{1+24a_3} - 3) &= \sqrt{1+24a_2} - 3 \\
2(\sqrt{1+24a_2} - 3) &= \sqrt{1+24a_1} - 3
\end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned}
2^{n-1}(\sqrt{1+24a_n} - 3) &= \sqrt{1+24a_1} - 3 \\
2^{n-1}(\sqrt{1+24a_n} - 3) &= 2 \\
\sqrt{1+24a_n} - 3 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \\
\sqrt{1+24a_n} &= 3 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \\
1+24a_n &= \left[3 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]^2 \\
a_n &= \frac{\left[3 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right]^2 - 1}{24} \quad n \in \mathbb{N}^+
\end{aligned}$$


---

### 3.6. Feladatok új sorozat (új ismeretlen) bevezetésére

$$1. a_n = 3a_{n-1} + n; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

(Feladat: Szoldatics József)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 5$ ;  $a_3 = 18$ ;  $a_4 = 59$ ;  $a_5 = 183$   
Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= 3a_{n-1} + n \\ a_n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{4} &= 3a_{n-1} + \frac{3}{2}n + \frac{3}{4} \\ a_n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{4} &= 3a_{n-1} + \frac{3}{2}(n-1) + \frac{9}{4} \\ a_n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{4} &= 3 \left( a_{n-1} + \frac{1}{2}(n-1) + \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

Új sorozatot bevezetve

$$\begin{aligned} b_n &= a_n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{4} \\ b_n &= 3b_{n-1} \\ b_1 &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

Ez egy „sima” mértani sor

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{9}{4} 3^{n-1} \\ b_n &= \frac{1}{4} 3^{n+1} \\ a_n &= b_n - \frac{1}{2}n - \frac{3}{4} \\ a_n &= \frac{3^{n+1} - 2n - 3}{4}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

$$2. a_n = (n-1)a_{n-1} + n^2 - 3n + 1; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 2$ ;  $a_3 = 9$ ;  $a_4 = 44$ ;  $a_5 = 235$   
Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= (n-1)a_{n-1} + n^2 - 3n + 1 \\ a_n + n &= (n-1)a_{n-1} + (n-1)^2 \\ a_n + n &= (n-1)(a_{n-1} + (n-1)) \end{aligned}$$

Új sorozatot bevezetve

$$b_n = a_n + n$$



$$b_1 = 2$$

$$b_n = (n-1)b_{n-1}$$

Index léptetést végrehajtva

$$b_n = (n-1)b_{n-1}$$

$$b_{n-1} = (n-2)b_{n-2}$$

$$\dots$$

$$b_3 = 2 \cdot b_2$$

$$b_2 = 1 \cdot b_1$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$b_n = b_1 \cdot n!$$

$$b_n = 2 \cdot n!$$

$$a_n = b_n - n$$

$$a_n = 2 \cdot n! - n; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$$3. \quad a_n = 2a_{n-1} + 3^{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$$

(Feladat: Szoldatics József)

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 2$ ;  $a_2 = 7$ ;  $a_3 = 23$ ;  $a_4 = 73$ ;  $a_5 = 227$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 2a_{n-1} + 3^{n-1}$$

$$a_n - 3^n = 2a_{n-1} - 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$a_n - 3^n = 2(a_{n-1} - 3^{n-1})$$

Új sorozatot bevezetve

$$b_n = a_n - 3^n$$

$$b_1 = -1$$

$$b_n = 2b_{n-1}$$

Ez egy „sima” mértani sorozat

$$b_n = -2^{n-1}$$

$$a_n = b_n + 3^n$$

$$a_n = 3^n - 2^{n-1}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

### 3.7. Feladatok vegyesen (oldjuk meg „bármilyen áron és módszerrel”)

1. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle 1-gyel eltérő számjegy követhet, azaz (1 → 2; 2 → 1,3; 3 → 2). Hány ilyen sorozat van?

(Feladat: Szoldatics József)

Felírva, hogy honnan hova történhet a lépés

Darab	...	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-1}$	$b_n$
3	...	$c_{n-1}$	$c_n$
Összes	...	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	1	2	2	4	...	6	...	128	...	512
2	1	2	2	4	4	...	32	...	128	...	1024
3	1	1	2	2	4	...	16	...	128	...	512
Összes	3	4	6	8	12	...	64	...	384	...	2048

$$\text{Darab}(n) = \begin{cases} 2^{k+1}; & n = 2k \\ 3 \cdot 2^k; & n = 2k + 1 \end{cases}$$

2. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle legfeljebb 1-gyel eltérő számjegy követhet, azaz (1 → 1, 2; 2 → 1,2,3; 3 → 2, 3) . Hány ilyen sorozat van?

(Feladat: Szoldatics József)

Felírva, hogy honnan hova történhet a lépés

Darab	...	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-1}$	$b_n$
3	...	$c_{n-1}$	$c_n$
Összes	...	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	2	5	12	29	...	2378	...	195025	...	15994428
2	1	3	7	17	41	...	3363	...	275807	...	22619537
3	1	2	5	12	29	...	2378	...	195025	...	15994428
Összes	3	7	17	41	99	...	8119	...	665857	...	54608393

$$\text{Darab}(n) = 2 \cdot \text{Darab}(n - 1) + \text{Darab}(n - 2)$$

3. Az 1, 2, 3 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ...) hosszú számsorozatot, de minden számjegyet csak tőle legfeljebb 1-gyel eltérő számjegy követhet, de 2-t 2-es nem követhet, azaz (1 → 1, 2; 2 → 1,3; 3 → 2, 3). Hány ilyen sorozat van?

(Feladat: Szoldatics József)

.....

Felírva, hogy honnan hova történhet a lépés

Darab	...	$n - 1$	$n$
1	...	$a_{n-1}$	$a_n$
2	...	$b_{n-1}$	$b_n$
3	...	$c_{n-1}$	$c_n$
Összes	...	$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva

Darab	1	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
1	1	2	4	8	16	...	512	...	16384	...	524288
2	1	2	4	8	16	...	512	...	16384	...	524288
3	1	2	4	8	16	...	512	...	16384	...	524288
Összes	3	6	12	24	48	...	1536	...	49152	...	1572864

$$\text{Darab}(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$$

4. Az 1, 2 számjegyek felhasználásával képezzünk 10 (15; 20; ... hosszú) számsorozatot, de 1-es csak legalább 2db 2-es után állhat (vagy 1-es után), azaz (1 → 1, 2; 12 → 2, 22 → 1, 2). Hány ilyen sorozat van?

(Feladat: Szoldatics József)

.....

Felírva, hogy honnan hova történhet a lépés

Darab	...	$n - 1$	$n$
11	...	$a_{n-1}$	$a_n$
12	...	$b_{n-1}$	$b_n$
21	...	$c_{n-1}$	$c_n$
22	...	$d_{n-1}$	$d_n$
Összes		$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva

Darab	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
11	1	1	2	4	...	114	...	1897	...	31572
12	1	1	2	4	...	114	...	1897	...	31572
21	0	1	2	3	...	86	...	1432	...	23833
22	1	2	3	5	...	151	...	2513	...	41824
Összes	3	5	9	16	...	465	...	7739	...	128801

5. Kettes számrendszerbeli 10 (15; 20; ...) hosszú számok száma, ha 0-s csak dupla 1-es után állhat, azaz (01 → 1; 11 → 0,1; 0 → 1 )

(Feladat: Szoldatics József)

Felírva, hogy honnan hova történhet a lépés

Darab	...	$n - 1$	$n$
00	...	0	0
01	...	$b_{n-1}$	$b_n$
10	...	$c_{n-1}$	$c_n$
11	...	$d_{n-1}$	$d_n$
Összes		$s_{n-1}$	$s_n$

Ezt végigfuttatva

Darab	2	3	4	5	...	10	...	15	...	20
00	0	0	0	0	...	0	...	0	...	0
01	0	0	1	1	...	6	...	41	...	277
10	0	1	1	1	...	9	...	60	...	406
11	1	1	1	2	...	13	...	88	...	595
Összes	1	2	3	4	...	28	...	189	...	1278

$$6. a_n = \frac{(n+1)n(n-1)}{(n+4)(n+3)(n+2)}(a_{n-1}+1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$$

(Feladat: Csorba Ferenc, Kvant)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 0; a_2 = \frac{1}{20}; a_3 = \frac{3}{25}; a_4 = \frac{1}{5}; a_5 = \frac{2}{7}$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = \frac{(n+1)n(n-1)}{(n+4)(n+3)(n+2)}(a_{n-1}+1)$$

$$(n+4)(n+3)(n+2)a_n = (n+1)n(n-1)a_{n-1} + (n+1)n(n-1)$$

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n = (n+3)(n+2)^2(n+1)^3n^2(n-1)a_{n-1} +$$

$$+ (n+3)(n+2)^2(n+1)^3n^2(n-1)$$

A jobb oldal második tagját kifejtve

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n =$$

$$= (n+3)(n+2)^2(n+1)^3n^2(n-1)a_{n-1} +$$

$$+ n^9 + 9n^8 + 30n^7 + 42n^6 + 9n^5 - 39n^4 - 40n^3 - 12n^2$$

Index léptetést végrehajtva

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n =$$

$$= (n+3)(n+2)^2(n+1)^3n^2(n-1)a_{n-1} +$$

$$+ n^9 + 9n^8 + 30n^7 + 42n^6 + 9n^5 - 39n^4 - 40n^3 - 12n^2$$

$$(n+3)(n+2)^2(n+1)^3n^2(n-1)a_{n-1} =$$

$$= (n+2)(n+1)^2n^3(n-1)^2(n-2)a_{n-2} +$$

$$+ (n-1)^9 + 9(n-1)^8 + 30(n-1)^7 + 42(n-1)^6 +$$

$$+ 9(n-1)^5 - 39(n-1)^4 - 40(n-1)^3 - 12(n-1)^2$$

...

$$7 \cdot 6^2 \cdot 5^3 \cdot 4^2 \cdot 3a_3 = 6 \cdot 5^2 \cdot 4^3 \cdot 3^2 \cdot 2a_2 + 3^9 + 9 \cdot 3^8 + 30 \cdot 3^7 + 42 \cdot 3^6 +$$

$$+ 9 \cdot 3^5 - 39 \cdot 3^4 - 40 \cdot 3^3 - 12 \cdot 3^2$$

$$6 \cdot 5^2 \cdot 4^3 \cdot 3^2 \cdot 2a_2 = 5 \cdot 4^2 \cdot 3^3 \cdot 2^2 \cdot 1a_1 + 2^9 + 9 \cdot 2^8 + 30 \cdot 2^7 + 42 \cdot 2^6 +$$

$$+ 9 \cdot 2^5 - 39 \cdot 2^4 - 40 \cdot 2^3 - 12 \cdot 2^2$$

Összeadva és rendezve

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n = 8640a_1 +$$

$$+ \sum_{i=2}^n i^9 + 9 \sum_{i=2}^n i^8 + 30 \sum_{i=2}^n i^7 + 42 \sum_{i=2}^n i^6 + 9 \sum_{i=2}^n i^5 - 39 \sum_{i=2}^n i^4 - 40 \sum_{i=2}^n i^3 - 12 \sum_{i=2}^n i^2$$

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n = 8640a_1 +$$

$$+ \frac{(n-1)n^2(n+1)^2(n+2)^2(n+3)^2(n+4)}{10}$$

$$(n+4)(n+3)^2(n+2)^3(n+1)^2na_n = \frac{(n-1)n^2(n+1)^2(n+2)^2(n+3)^2(n+4)}{10}$$

$$(n+2)a_n = \frac{(n-1)n}{10}$$

$$a_n = \frac{(n-1)n}{10(n+2)}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$


---

7.  $a_n = \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^2 a_{n-1} + \frac{1}{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = A$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = A; a_2 = 1; a_3 = \frac{3}{4}; a_4 = \frac{2}{3}; a_5 = \frac{5}{8}$   
 Rendezve a rekurziós összefüggést

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^2 a_{n-1} + \frac{1}{n-1}$$

$$(n-1)^2 a_n = (n-2)^2 a_{n-1} + (n-1)$$

Index léptetést végrehajtva

$$(n-1)^2 a_n = (n-2)^2 a_{n-1} + (n-1)$$

$$(n-2)^2 a_{n-1} = (n-3)^2 a_{n-2} + (n-2)$$

...

$$3^2 a_4 = 2^2 a_3 + 3$$

$$2^2 a_3 = 1^2 a_2 + 2$$

Összeadva és rendezve

$$(n-1)^2 a_n = a_2 + 2 + 3 + \dots + (n-1)$$

$$(n-1)^2 a_n = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)$$

$$(n-1)^2 a_n = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$a_n = \frac{n}{2(n-1)}; \quad n \geq 2$$

$$a_1 = A; \quad a_n = \frac{n}{2(n-1)}; \quad n \geq 2; \quad n \in \mathbb{N}^+$$


---

8.  $a_n = 1 - \frac{n-1}{n} a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = \frac{1}{2}$ ;  $a_3 = \frac{2}{3}$ ;  $a_4 = \frac{1}{2}$ ;  $a_5 = \frac{3}{5}$ ;  $a_6 = \frac{1}{2}$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 1 - \frac{n-1}{n}a_{n-1}$$

$$na_n + (n-1)a_{n-1} = n$$

Új sorozatot bevezetve

$$b_n = na_n$$

$$b_1 = b_2 = 1$$

Index léptetést végrehajtva

$$b_n + b_{n-1} = n$$

$$b_{n-1} + b_{n-2} = n-1; \quad n \geq 3$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$b_n - b_{n-2} = 1$$

$$b_n = 1 + b_{n-2}$$

$$b_{2n-1} = b_{2n} = n$$

$$a_n = \begin{cases} \frac{k}{2k-1} & n = 2k-1 \\ \frac{1}{2} & n = 2k \end{cases} \quad n; k \in \mathbb{N}^+$$

9.  $a_n = -\frac{1}{n}a_{n-1} + \frac{n-2}{n-1}a_{n-2}; \quad n \geq 3; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = \frac{1}{2}$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = \frac{1}{2}$ ;  $a_3 = \frac{1}{3}$ ;  $a_4 = \frac{1}{4}$ ;  $a_5 = \frac{1}{5}$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$(n-1)na_n = -(n-1)a_{n-1} + n(n-2)a_{n-2}$$

Új sorozatot bevezetve

$$b_n = na_n$$

$$b_1 = b_2 = 1$$

$$(n-1)b_n = -b_{n-1} + nb_{n-2}$$

Index léptetést végrehajtva

$$(n-1)[b_n - b_{n-2}] = b_{n-2} - b_{n-1}$$

$$(n-2)[b_{n-1} - b_{n-3}] = b_{n-3} - b_{n-2}$$

$$\dots$$

$$3[b_4 - b_2] = b_3 - b_2$$

$$2[b_3 - b_1] = b_2 - b_1$$

Mivel az utolsó egyenlet jobb oldala nulla ( $b_1 = b_2 = 1$ ), ezért a bal is ( $b_1 = b_3 = 1 = b_2$ ) és ez végigfut az egyenleteken, azaz

$$b_n = 1$$

$$a_n = \frac{1}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

10.  $na_n = 2(2n - 1)a_{n-1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$

Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

(Feladat: KÖMAL, 1995/május, Gy.2992)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 2; a_2 = 6; a_3 = 20; a_4 = 70; a_5 = 252$

Index léptetést végrehajtva

$$na_n = 2(2n - 1)a_{n-1}$$

$$(n - 1)a_{n-1} = 2(2n - 3)a_{n-2}$$

...

$$3a_3 = 2 \cdot 5 \cdot a_2$$

$$2a_2 = 2 \cdot 3 \cdot a_1$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$n!a_n = 2^{n-1} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)a_1$$

$$a_n = 2^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{n!}$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 2^n \frac{n! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{n! \cdot n!}$$

$$a_n = \frac{1 \cdot (1 \cdot 2) \cdot 3 \cdot (2 \cdot 2) \cdot 5 \cdot (3 \cdot 2) \cdot \dots \cdot (2n - 1) \cdot (2n)}{n! \cdot n!}$$

$$a_n = \frac{(2n)!}{n! \cdot n!}$$

$$a_n = \binom{2n}{n}; \quad n \in \mathbb{N}^+$$

Ez pedig egész.



11.  $a_n = \frac{1}{2} (3a_{n-1} + \sqrt{5a_{n-1}^2 - 4})$ ;  $n \geq 2$ ;  $a_1 = 1$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 2$ ;  $a_3 = 5$ ;  $a_4 = 13$ ;  $a_5 = 34$   
 Rendezve a rekurziós összefüggést

$$a_n = \frac{1}{2} \left( 3a_{n-1} + \sqrt{5a_{n-1}^2 - 4} \right)$$

$$2a_n - 3a_{n-1} = \sqrt{5a_{n-1}^2 - 4}$$

$$4a_n^2 - 12a_n a_{n-1} + 9a_{n-1}^2 = 5a_{n-1}^2 - 4$$

$$4a_n^2 - 12a_n a_{n-1} + 4a_{n-1}^2 = -4$$

$$\begin{cases} 4a_n^2 - 12a_n a_{n-1} + 4a_{n-1}^2 = -4 \\ 4a_{n-1}^2 - 12a_{n-1} a_{n-2} + 4a_{n-2}^2 = -4; \quad n \geq 3 \end{cases}$$

$$4a_n^2 - 4a_{n-2}^2 + 12a_{n-1} a_{n-2} - 12a_n a_{n-1} = 0$$

$$(a_n - a_{n-2})(4a_n + 4a_{n-2} - 12a_{n-1}) = 0$$

$$a_n = 3a_{n-1} - a_{n-2}; \quad n \geq 3$$

Ez azt mutatja, hogy ha a sorozatban van két egymás utáni egész szám, akkor a következő is egész, azaz inentől minden szám egész. Az adott sorozat első két eleme egész, tehát a sorozat minden eleme egész szám.

12.  $a_n = 3a_{n-1} + \sqrt{8a_{n-1}^2 - 8}$ ;  $n \geq 2$ ;  $a_1 = 1$   
 Igazoljuk, hogy a sorozat egész számokból áll.

(Feladat: Szoldatics József)

.....  
 A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 3$ ;  $a_3 = 17$ ;  $a_4 = 99$ ;  $a_5 = 577$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n - 3a_{n-1} = \sqrt{8a_{n-1}^2 - 8}$$

$$a_n^2 - 6a_n a_{n-1} + 9a_{n-1}^2 = 8a_{n-1}^2 - 8$$

$$a_n^2 - 6a_n a_{n-1} + a_{n-1}^2 = -8$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{cases} a_n^2 - 6a_n a_{n-1} + a_{n-1}^2 = -8 \\ a_{n-1}^2 - 6a_{n-1} a_{n-2} + a_{n-2}^2 = -8; \quad n \geq 3 \end{cases}$$

$$a_n^2 - a_{n-2}^2 + a_{n-1} a_{n-2} - 6a_n a_{n-1} = 0$$

$$(a_n - a_{n-2})(a_n + a_{n-2} - 6a_{n-1}) = 0$$

$$a_n = 6a_{n-1} - a_{n-2}; \quad n \geq 3$$

Ez azt mutatja, hogy ha a sorozatban van két egymás utáni egész szám, akkor a következő is egész, azaz inentől minden szám egész. Az adott sorozat első két eleme egész, tehát a sorozat minden eleme egész szám.

$$13. a_n = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}(a_{n-1} + 1); \quad n \geq 2; \quad a_1 = 0$$

(Feladat: Csorba Ferenc, Kvant)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}(a_{n-1} + 1) \\ (n+2)(n+1)a_n &= n(n-1)a_{n-1} + n(n-1) \\ (n+2)(n+1)^2 na_n &= (n+1)n^2(n-1)a_{n-1} + n^2(n^2-1) \end{aligned}$$

A jobb oldal második tagját kifejtve

$$(n+2)(n+1)^2 na_n = (n+1)n^2(n-1)a_{n-1} + n^4 - n^2$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} (n+2)(n+1)^2 na_n &= (n+1)n^2(n-1)a_{n-1} + n^4 - n^2 \\ (n+1)n^2(n-1)a_{n-1} &= n(n-1)^2(n-2)a_{n-2} + (n-1)^4 - (n-1)^2 \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} 5 \cdot 4^2 \cdot 3a_3 &= 5 \cdot 4^2 \cdot 3a_3 = 4 \cdot 3^2 \cdot 2a_2 + 3^4 - 3^2 \\ 4 \cdot 3^2 \cdot 2a_2 &= 4 \cdot 3^2 \cdot 2a_2 = 3 \cdot 2^2 \cdot 1a_1 + 2^4 - 2^2 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} (n+2)(n+1)^2 na_n &= 12a_1 + \sum_{i=2}^n i^4 - \sum_{i=2}^n i^2 = 12a_1 + \sum_{i=1}^n i^4 - \sum_{i=1}^n i^2 \\ (n+2)(n+1)^2 na_n &= 12a_1 + \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \\ &= 12a_1 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \left[ \frac{3n^2+3n-1}{5} - 1 \right] = \\ &= 12a_1 + \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-6)}{30} = \\ &= 12a_1 + \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)(2n+1)}{10} \\ (n+2)(n+1)^2 na_n &= \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)(2n+1)}{10} \\ a_n &= \frac{(n-1)(2n+1)}{10(n+1)}; \quad n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

$$14. a_n = a_{n-1} + 4\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 2; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2$$

(Feladat: Szoldatics József)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 2$ ;  $a_2 = 8$ ;  $a_3 = 18$ ;  $a_4 = 32$ ;  $a_5 = 50$

$$a_n = a_{n-1} + 4\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 2 > 0$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + 4\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 2 \\ \frac{a_n}{2} &= \frac{a_{n-1}}{2} + 2\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 1 \\ \frac{a_n}{2} &= \left(\sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 1\right)^2 \\ \sqrt{\frac{a_n}{2}} &= \sqrt{\frac{a_{n-1}}{2}} + 1 \end{aligned}$$

Teleszkopikus összeget alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{a_n}{2}} &= n \\ a_n &= 2n^2 \end{aligned}$$

15.  $a_n = \frac{2a_{n-1} - 4}{a_{n-1}}$ ;  $n \geq 2$ ;  $a_1 = 1$

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = -2$ ;  $a_3 = 4$ ;  $a_4 = 1$ ;  $a_5 = -2$

Tehát a sorozat periodikus, ezért

$$2017 = 3 \cdot 672 + 1$$

$$a_{2017} = a_1 = 1$$

16.  $a_n = 9 + 6\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}$ ;  $n \geq 2$ ;  $a_1 = 1$

(Feladat: Szoldatics József)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 15$ ;  $a_3 = 33$ ;  $a_4 = 51$ ;  $a_5 = 69$

A sorozat elemeit vizsgálva

$$a_n = 9 + 6\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}} > 9; \quad n \geq 2$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 9 + 6\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}$$

$$\frac{a_n - 9}{6} = \sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}$$

$$\left(\frac{a_n - 9}{6}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{cases} \left(\frac{a_n - 9}{6}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \\ \left(\frac{a_{n-1} - 9}{6}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2}; \end{cases} \quad n \geq 3$$

$$\left(\frac{a_n - 9}{6}\right)^2 = \left(\frac{a_{n-1} - 9}{6}\right)^2 + a_{n-1}; \quad n \geq 2$$

$$\left(\frac{a_n - 9}{6}\right)^2 = \left(\frac{a_{n-1} + 9}{6}\right)^2$$

$$\frac{a_n - 9}{6} = \frac{a_{n-1} + 9}{6}$$

$$a_n = a_{n-1} + 18; \quad n \geq 3$$

Index léptetést végrehajtva

$$a_n = a_{n-1} + 18$$

$$a_{n-1} = a_{n-2} + 18$$

$$\dots$$

$$a_4 = a_3 + 18$$

$$a_3 = a_2 + 18$$

Összeadva és rendezve

$$a_n = a_2 + 18(n - 2) = 18n - 3; \quad n \geq 2$$

17.  $a_n = 25 + 10\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

(Feladat: Szoldatics József)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 35; a_3 = 85; a_4 = 135; a_5 = 185$

A sorozat elemeit vizsgálva

$$a_n = 25 + 10\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}} > 25; \quad n \geq 2$$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 25 + 10\sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}$$

$$\frac{a_n - 25}{10} = \sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}$$

$$\left(\frac{a_n - 25}{10}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{cases} \left(\frac{a_n - 25}{10}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \\ \left(\frac{a_{n-1} - 25}{10}\right)^2 = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2}; \end{cases} \quad n \geq 3$$

$$\left(\frac{a_n - 25}{10}\right)^2 = \left(\frac{a_{n-1} - 25}{10}\right)^2 + a_{n-1}$$

$$\left(\frac{a_n - 25}{10}\right)^2 = \left(\frac{a_{n-1} + 25}{10}\right)^2$$

$$\frac{a_n - 25}{10} = \frac{a_{n-1} + 25}{10}$$

$$a_n = a_{n-1} + 50; \quad n \geq 3$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + 50 \\ a_{n-1} &= a_{n-2} + 50 \\ &\dots \\ a_4 &= a_3 + 50 \\ a_3 &= a_2 + 50 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_2 + (n - 2)50 \\ a_n &= 50n - 65; \quad n \geq 2 \end{aligned}$$

18.  $a_n = \frac{a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2}{a_{n-3}}; \quad n \geq 4; \quad a_1 = a_2 = a_3 = 1$

(Feladat: KÖMAL, 2001/április A.265)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 1; a_3 = 1; a_4 = 2; a_5 = 5$   
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2}{a_{n-3}} \\ a_n a_{n-3} &= a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2 \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{cases} a_n a_{n-3} &= a_{n-1}^2 + a_{n-2}^2 \\ a_{n-1} a_{n-4} &= a_{n-2}^2 + a_{n-3}^2 \end{cases} \quad n \geq 5$$

$$\begin{aligned} a_n a_{n-3} - a_{n-1} a_{n-4} &= a_{n-1}^2 - a_{n-3}^2 \\ a_n a_{n-3} + a_{n-3}^2 &= a_{n-1}^2 + a_{n-1} a_{n-4} \\ a_{n-3} (a_n + a_{n-3}) &= a_{n-1} (a_{n-1} + a_{n-4}) \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_{n-3} (a_n + a_{n-3}) &= a_{n-1} (a_{n-1} + a_{n-4}) \\ a_{n-4} (a_{n-1} + a_{n-4}) &= a_{n-2} (a_{n-2} + a_{n-5}) \\ a_{n-5} (a_{n-2} + a_{n-5}) &= a_{n-3} (a_{n-3} + a_{n-6}) \\ a_{n-6} (a_{n-3} + a_{n-6}) &= a_{n-4} (a_{n-4} + a_{n-7}) \\ &\dots \\ a_3 (a_6 + a_3) &= a_5 (a_5 + a_2) \\ a_2 (a_5 + a_2) &= a_4 (a_4 + a_1) \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_3 a_2 (a_n + a_{n-3}) &= a_{n-1} a_{n-2} (a_4 + a_1) \\ a_n &= 3a_{n-1} a_{n-2} - a_{n-3} \quad n \geq 5 \end{aligned}$$

Ez azt mutatja, hogy ha a sorozatban van három egymás utáni egész szám, akkor a következő is egész, azaz innentől minden szám egész. Az adott sorozat első három eleme egész, tehát a sorozat minden eleme egész szám.

19.  $x = \sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4\sqrt{-3 + 4x}}}}$   
 Oldjuk meg az egyenletet!

(Feladat: KÖMAL, 2002/október B.3579)

Legyen  $a_1 = x$  ( $x \geq \frac{3}{4}$ ); és  $a_n = \sqrt{-3 + 4a_{n-1}}$ .

Megoldandó a  $a_5 = a_1$  egyenlet.

Ha  $x = 1$  vagy  $x = 3$ , akkor nyilvánvaló, hogy megoldás.

Ha  $\frac{3}{4} \leq x < 1$

$$\begin{aligned} x = a_1 &< 1 \\ 4a_1 &< 4 \\ -3 + 4a_1 &< 1 \\ \sqrt{-3 + 4a_1} &< 1 \\ a_2 &< 1 \end{aligned}$$

azaz minden  $a_i < 1$ ,

és  $a_1 > \sqrt{-3 + 4a_1} = a_2$ , hiszen  $a_1^2 - 4a_1 + 3 > 0$ .

Ezekből következik, hogy

$$1 > a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > \dots$$

Ha  $1 < x < 3$

$$\begin{aligned} 1 < x = a_1 < 3 \\ 4 < 4a_1 < 12 \\ 1 < -3 + 4a_1 < 9 \\ 1 < \sqrt{-3 + 4a_1} < 3 \\ 1 < a_2 < 3 \end{aligned}$$

azaz minden  $1 < a_i < 3$ ,  
és  $a_1 < \sqrt{-3 + 4a_1} = a_2$ , hiszen  $a_1^2 - 4a_1 + 3 < 0$ .  
Ezekből következik, hogy

$$1 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < \dots < 3$$

Ha  $3 < x$

$$\begin{aligned} 3 < x = a_1 \\ 12 < 4a_1 \\ 9 < -3 + 4a_1 \\ 3 < \sqrt{-3 + 4a_1} \\ 3 < a_2 \end{aligned}$$

azaz minden  $3 < a_i$ ,  
és  $a_1 > \sqrt{-3 + 4a_1} = a_2$ , hiszen  $a_1^2 - 4a_1 + 3 > 0$ .  
Ezekből következik, hogy

$$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > \dots > 3$$

Összefoglalva, csak  $x = 1$  vagy  $x = 3$  a megoldás.

### Megjegyzés

Ha  $n$  gyököt alkalmaztunk, azaz az  $a_n = a_1$  egyenlet megoldását keressük, akkor is erre az eredményre jutunk.

20.  $a_n = \frac{1}{1 - a_{n-1}} - \frac{1}{1 + a_{n-1}}$

A sorozat periodikus. Mi lehet az első elem?

(Feladat: KÖMAL, 2003/február B.3620)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{1 - a_{n-1}} - \frac{1}{1 + a_{n-1}} \\ a_n &= \frac{2a_{n-1}}{1 - a_{n-1}^2} \\ a_1 &= \operatorname{tg} \alpha \end{aligned}$$

$$a_2 = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha} = \operatorname{tg}2\alpha$$

$$a_3 = \frac{2\operatorname{tg}2\alpha}{1 - \operatorname{tg}^22\alpha} = \operatorname{tg}4\alpha$$

...

$$a_n = \frac{2\operatorname{tg}2^{n-2}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^22^{n-2}\alpha} = \operatorname{tg}2^{n-1}\alpha$$

Ha periodikus, akkor

$$a_1 = a_n$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \operatorname{tg}2^{n-1}\alpha$$

$$2^{n-1}\alpha = \alpha + k\pi; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\alpha = \frac{k}{2^{n-1} - 1}\pi$$

$$a_1 = \operatorname{tg}\left(\frac{k}{2^{n-1} - 1}\pi\right); \quad n \geq 2$$


---

21.  $a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$  és  $a_1 < a_2$  pozitív egész szám. Igazoljuk, hogy  $a_{45} > 3^{43}$ .

(Feladat: KÖMAL 2004/szeptember B.3750)

.....

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$$

$$a_n - a_{n-1} = 3a_{n-1} - 3a_{n-2}$$

Index léptetést végrehajtva

$$a_n - a_{n-1} = 3(a_{n-1} - a_{n-2})$$

$$a_{n-1} - a_{n-2} = 3(a_{n-2} - a_{n-3})$$

$$a_{n-2} - a_{n-3} = 3(a_{n-3} - a_{n-4})$$

...

$$a_4 - a_3 = 3(a_3 - a_2)$$

$$a_3 - a_2 = 3(a_2 - a_1)$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$a_n - a_{n-1} = 3^{n-2}(a_2 - a_1)$$

$$a_n = 3^{n-2}(a_2 - a_1) + a_{n-1} > 3^{n-2} \cdot 1 + 0 = 3^{n-2}$$

$$a_n > 3^{n-2}$$


---



$$22. a_n = a_{n-1} - \frac{n}{(n+1)!}; \quad n \geq 2, a_1 = 2;$$

(Feladat: KÖMAL 2006/január B.3874)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} - \frac{n}{(n+1)!} \\ a_n &= a_{n-1} - \frac{n+1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!} \\ a_n &= a_{n-1} - \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} - \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \\ a_{n-1} &= a_{n-2} - \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \\ a_{n-2} &= a_{n-3} - \frac{1}{(n-2)!} + \frac{1}{(n-1)!} \\ &\dots \\ a_3 &= a_2 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \\ a_2 &= a_1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{(n+1)!} \\ a_n &= \frac{3}{2} + \frac{1}{(n+1)!} \end{aligned}$$

$$23. a_n = \frac{a_{n-1}}{2a_{n-1} + 1}; \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

Hány olyan tagja van a sorozatnak, amelyik nagyobb  $\frac{1}{100}$ -nál?

(Feladat: OKTV I.)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_{n-1}}{2a_{n-1} + 1} \\ \frac{1}{a_n} &= \frac{2a_{n-1} + 1}{a_{n-1}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a_n} = 2 + \frac{1}{a_{n-1}}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n} &= 2 + \frac{1}{a_{n-1}} \\ \frac{1}{a_{n-1}} &= 2 + \frac{1}{a_{n-2}} \\ &\dots \\ \frac{1}{a_3} &= 2 + \frac{1}{a_2} \\ \frac{1}{a_2} &= 2 + \frac{1}{a_1} \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_n} &= 2(n-1) + \frac{1}{a_1} = 2n-1 \\ a_n &= \frac{1}{2n-1} \end{aligned}$$

A feladat kérdésére válaszolva

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2n-1} > \frac{1}{100} \\ 2n-1 &< 100 \\ n &< \frac{101}{2} \end{aligned}$$

Tehát az első 50 elemre teljesül a feltétel.

24.  $a_n = a_{n-1} + n^2, \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$

Hány 5-tel osztható szám van a sorozat első 100 tagja között?

(Feladat: Orosz Gyula)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1; a_2 = 5; a_3 = 14; a_4 = 30; a_5 = 55$

Nézzük az osztási maradékok sorozatát:

$$m_1 = 1; m_2 = 0; m_3 = 4; m_4 = 0; m_5 = 0; m_6 = 1; m_7 = 0$$

és ez ismétlődik, ugyanis

$$\begin{aligned} m_{5k+1} &= 1 \\ m_{5k+2} &= 1 + (5k+2)^2 = 0 \\ m_{5k+3} &= 0 + (5k+3)^2 = 4 \\ m_{5k+4} &= 4 + (5k+4)^2 = 0 \\ m_{5k+5} &= 0 + (5k+5)^2 = 0 \\ m_{5k+6} &= m_{5(k+1)+1} = 0 + (5k+6)^2 = 1 \end{aligned}$$

Így  $20 \cdot 3 = 60$  ilyen szám van.

$$25. a_n = 3a_{n-1} + 2^n, \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1$$

(Feladat: Orosz Gyula)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 7$ ;  $a_3 = 29$ ;  $a_4 = 103$ ;  $a_5 = 341$   
Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= 3a_{n-1} + 2^n \\ a_n + 2^{n+1} &= 3a_{n-1} + 2^n + 2^{n+1} = 3a_{n-1} + 3 \cdot 2^n \\ a_n + 2^{n+1} &= 3(a_{n-1} + 2^n) \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n + 2^{n+1} &= 3(a_{n-1} + 2^n) \\ a_{n-1} + 2^n &= 3(a_{n-2} + 2^{n-1}) \\ a_{n-2} + 2^{n-1} &= 3(a_{n-3} + 2^{n-2}) \\ &\dots \\ a_3 + 2^4 &= 3(a_2 + 2^3) \\ a_2 + 2^3 &= 3(a_1 + 2^2) \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned} a_n + 2^{n+1} &= 3^{n-1}(a_1 + 2^2) \\ a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1} \end{aligned}$$

$$26. a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = 0; \quad a_2 = 1$$

(Feladat: Orosz Gyula)

Megoldva

$$\begin{aligned} r^2 - r - 6 &= 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = -2; \quad r_2 = 3 \\ a_n &= C_1 \cdot (-2)^{n-1} + C_2 \cdot 3^{n-1} \\ a_1 &= C_1 + C_2 = 0 \\ a_2 &= -2C_1 + 3C_2 = 1 \\ C_1 &= -\frac{1}{5}; \quad C_2 = \frac{1}{5} \\ a_n &= -\frac{1}{5} \cdot (-2)^{n-1} + \frac{1}{5} \cdot 3^{n-1} \\ a_n &= \frac{3^{n-1} - (-2)^{n-1}}{5} \end{aligned}$$

$$27. a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = 3$$

(Feladat: Orosz Gyula)

Karakterisztikus egyenlet

$$r^2 - 2r + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = 1 + i; \quad r_2 = 1 - i$$

Ezt felhasználva

$$a_n = \frac{1 - 2i}{2} (1 + i)^{n-1} + \frac{1 + 2i}{2} (1 - i)^{n-1}$$

$$28. a_n = a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-3}, \quad n \geq 4; \quad a_1 = 1; \quad a_2 = 2; \quad a_3 = 2; \quad a_{2017} = ?$$

(Feladat: AD, 1985)

$$a_1 = 1; \quad a_2 = 2; \quad a_3 = 2; \quad a_4 = 1; \quad a_5 = 1; \quad a_6 = 2; \quad a_7 = 2; \quad a_8 = 1$$

Periódikus a sorozat, tehát  $a_{2017} = a_1 = 1$

$$29. a_n = \frac{a_{n-1}a_{n-2}}{3a_{n-2} - 2a_{n-1}}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = \frac{1}{2}; \quad a_2 = \frac{1}{3}$$

(Feladat: NMMV, 1992)

A sorozat elemeit számolva:  $a_1 = \frac{1}{2}; a_2 = \frac{1}{3}; a_3 = \frac{1}{5}; a_4 = \frac{1}{9}; a_5 = \frac{1}{17}$

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_{n-1}a_{n-2}}{3a_{n-2} - 2a_{n-1}} \\ \frac{1}{a_n} &= \frac{3a_{n-2} - 2a_{n-1}}{a_{n-1}a_{n-2}} \\ \frac{1}{a_n} &= \frac{3}{a_{n-1}} - \frac{2}{a_{n-2}} \end{aligned}$$

Új sorozatot bevezetve

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{a_n} \\ b_1 &= 2 \\ b_2 &= 3 \\ b_n &= 3b_{n-1} - 2b_{n-2} \end{aligned}$$

Megoldva

$$b_n = 2^{n-1} + 1$$

Ezt felhasználva

$$a_n = \frac{1}{2^{n-1} + 1}; \quad n \geq 2$$

$$30. \quad a_n = \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}}, \quad n \geq 3; \quad a_1 = -3; \quad a_2 = 2$$

(Feladat: Orosz Gyula)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}} \\ a_n a_{n-2} &= a_{n-1}^2 \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned} a_n a_{n-2} &= a_{n-1}^2 \\ a_{n-1} a_{n-3} &= a_{n-2}^2 \\ a_{n-2} a_{n-4} &= a_{n-3}^2 \\ &\dots \\ a_5 a_3 &= a_4^2 \\ a_4 a_2 &= a_3^2 \\ a_3 a_1 &= a_2^2 \end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$\begin{aligned} a_1 a_n &= a_{n-1} a_2 \\ a_n &= a_{n-1} \left( -\frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

Ez egy mértani sorozat

$$a_n = -3 \cdot \left( -\frac{2}{3} \right)^{n-1}$$

$$31. \quad \begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3b_{n-1} \\ b_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1} \end{cases} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 2; \quad b_1 = 0$$

(Feladat: Szoldatics József)

$$\begin{aligned} a_1 &= 2; & a_2 &= 4; & a_3 &= 26; & a_4 &= 124 \\ b_1 &= 0; & b_2 &= 6; & b_3 &= 24; & b_4 &= 126 \end{aligned}$$

Az első egyenletből

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 3b_{n-1} \\ 3b_{n-1} &= a_n - 2a_{n-1} \end{aligned}$$

$$3b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

Ezt felhasználva a második egyenletbe

$$\begin{aligned} b_n &= 3a_{n-1} + 2b_{n-1} \\ 3b_n &= 9a_{n-1} + 6b_{n-1} \\ a_{n+1} - 2a_n &= 9a_{n-1} + 2(a_n - 2a_{n-1}) \\ a_{n+1} &= 4a_n + 5a_{n-1} \\ a_n &= 4a_{n-1} + 5a_{n-2} \end{aligned}$$

Ugyanezt kapnánk a  $b_n$  sorozatra is, azaz

$$b_n = 4b_{n-1} + 5b_{n-2}$$

A rekurziós összefüggést megoldva

$$r^2 - 4r - 5 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = -1; \quad r_2 = 5$$

A megoldva kapjuk, hogy

$$a_n = (-1)^{n-1} + 5^{n-1}; \quad b_n = 5^{n-1} - (-1)^{n-1}$$

$$32. \quad \begin{cases} a_n = 4a_{n-1} + 2b_{n-1} \\ b_n = 5a_{n-1} - 3b_{n-1} \end{cases} \quad n \geq 2; \quad a_1 = 1; \quad b_1 = -1$$

(Feladat: Orosz Gyula)

$$\begin{aligned} a_1 &= 1; & a_2 &= 2; & a_3 &= 24; & a_4 &= 68 \\ b_1 &= -1; & b_2 &= 8; & b_3 &= -14; & b_4 &= 162 \end{aligned}$$

Az első egyenletből

$$\begin{aligned} a_n &= 4a_{n-1} + 2b_{n-1} \\ 2b_{n-1} &= a_n - 4a_{n-1} \\ 2b_n &= a_{n+1} - 4a_n \end{aligned}$$

Ezt felhasználva a második egyenletbe

$$\begin{aligned} b_n &= 5a_{n-1} - 3b_{n-1} \\ 2b_n &= 10a_{n-1} - 6b_{n-1} \\ a_{n+1} - 4a_n &= 10a_{n-1} - 3(a_n - 4a_{n-1}) \\ a_{n+1} &= a_n + 22a_{n-1} \\ a_n &= a_{n-1} + 22a_{n-2} \end{aligned}$$

Ugyanezt kapnánk a  $b_n$  sorozatra is, azaz

$$b_n = b_{n-1} + 22b_{n-2}$$

A rekurziós összefüggést megoldva

$$r^2 - r - 22 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{1 + \sqrt{89}}{2}; \quad r_2 = \frac{1 - \sqrt{89}}{2}$$

A megoldva kapjuk, hogy

$$a_n = \left( \frac{89 + 3\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 + \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1} + \left( \frac{89 - 3\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 - \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1}$$

$$b_n = \left( \frac{-89 + 17\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 + \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1} + \left( \frac{-89 - 17\sqrt{89}}{178} \right) \left( \frac{1 - \sqrt{89}}{2} \right)^{n-1}$$


---

33.  $na_n = (2n - 2)a_{n-1} - (n - 2)a_{n-2}; \quad n \geq 3; \quad a_1 = 5; \quad a_2 = 4$

(Feladat: Szoldatics József)

Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$na_n = (2n - 2)a_{n-1} - (n - 2)a_{n-2}$$

$$na_n - na_{n-1} = (n - 2)a_{n-1} - (n - 2)a_{n-2}$$

$$n(a_n - a_{n-1}) = (n - 2)(a_{n-1} - a_{n-2})$$

Index léptetést végrehajtva

$$n(a_n - a_{n-1}) = (n - 2)(a_{n-1} - a_{n-2})$$

$$(n - 1)(a_{n-1} - a_{n-2}) = (n - 3)(a_{n-2} - a_{n-3})$$

$$(n - 2)(a_{n-2} - a_{n-3}) = (n - 4)(a_{n-3} - a_{n-4})$$

$$\dots$$

$$4(a_4 - a_3) = 2(a_3 - a_2)$$

$$3(a_3 - a_2) = 1(a_2 - a_1)$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$n(n - 1)(a_n - a_{n-1}) = 2(a_2 - a_1)$$

$$a_n - a_{n-1} = -\frac{2}{n(n - 1)}$$

$$a_n = a_{n-1} - \frac{2}{n(n - 1)}$$

$$a_n = a_{n-1} - \frac{2}{n - 1} + \frac{2}{n}$$

Index léptetést végrehajtva

$$a_n = a_{n-1} - \frac{2}{n - 1} + \frac{2}{n}$$

$$\begin{aligned}
 a_{n-1} &= a_{n-2} - \frac{2}{n-2} + \frac{2}{n-1} \\
 a_{n-2} &= a_{n-3} - \frac{2}{n-3} + \frac{2}{n-2} \\
 &\dots \\
 a_3 &= a_2 - \frac{2}{2} + \frac{2}{3} \\
 a_2 &= a_1 - \frac{2}{1} + \frac{2}{2}
 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$\begin{aligned}
 a_n &= a_1 - 2 + \frac{2}{n} \\
 a_n &= 3 + \frac{2}{n} = \frac{3n+2}{n} \quad n \in \mathbb{N}^+
 \end{aligned}$$


---

34.  $a_n = a_{n-1} - a_{n-1}^2$ ;  $n \geq 2$ ;  $0 < a_1 < 1$ ;  
 Bizonyítsuk be, hogy  $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_k^2 < 1$

(Feladat: KÖMAL, 1998/október Gy.3246)

.....  
 $a_n = a_{n-1} - a_{n-1}^2 = a_{n-1}(1 - a_{n-1})$ ; ezért  $0 < a_n < 1$ .  
 Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\begin{aligned}
 a_n &= a_{n-1} - a_{n-1}^2 \\
 a_{n-1}^2 &= a_{n-1} - a_n
 \end{aligned}$$

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned}
 a_k^2 &= a_k - a_{k+1} \\
 a_{k-1}^2 &= a_{k-1} - a_k \\
 a_{k-2}^2 &= a_{k-2} - a_{k-1} \\
 &\dots \\
 a_2^2 &= a_2 - a_3 \\
 a_1^2 &= a_1 - a_2
 \end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2 = a_1 - a_{k+1} < a_1 < 1; \quad k \in \mathbb{N}^+$$


---

35.  $\frac{a_n}{a_{n-2}} + 6 \cdot \frac{a_{n-3}}{a_{n-1}} = 5$ ;  $n \geq 4$ ;  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 2$ ;  $a_3 = \frac{5}{2}$

(Feladat: Szoldatics József)



Rendezve a sorozat képzési szabályát

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} + 6 \cdot \frac{a_{n-3}}{a_{n-1}} = 5$$

$$a_n a_{n-1} + 6 a_{n-2} a_{n-3} = 5 a_{n-1} a_{n-2}$$

Vezessünk be új sorozatot

$$b_n = a_n a_{n+1}$$

$$b_1 = a_1 a_2 = 2$$

$$b_2 = a_2 a_3 = 5$$

$$b_n = 5 b_{n-1} - 6 b_{n-2}$$

ennek megoldása

$$b_n = 2^{n-1} + 3^{n-1}$$

Index léptetést végrehajtva

$$1 + 1 = a_1 a_2$$

$$2 + 3 = a_2 a_3$$

$$2^2 + 3^2 = a_3 a_4$$

$$2^3 + 3^3 = a_4 a_5$$

$$\dots$$

$$2^{n-1} + 3^{n-1} = a_n a_{n+1}$$

Ha  $n = 2k$

$$a_1 a_2 \cdot a_3 a_4 \cdot \dots \cdot a_{2k-1} a_{2k} = (1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})$$

$$a_2 a_3 \cdot a_4 a_5 \cdot \dots \cdot a_{2k-2} a_{2k-1} = (2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-3} + 3^{2k-3})$$

$$a_1 a_{2k} (2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-3} + 3^{2k-3}) = (1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})$$

$$a_{2k} = \frac{(1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})}{(2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-3} + 3^{2k-3})}$$

Ha  $n = 2k + 1$

$$a_1 a_2 \cdot a_3 a_4 \cdot \dots \cdot a_{2k-1} a_{2k} = (1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})$$

$$a_2 a_3 \cdot a_4 a_5 \cdot \dots \cdot a_{2k} a_{2k+1} = (2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-1} + 3^{2k-1})$$

$$a_1 a_{2k+1} (1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2}) = (2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-1} + 3^{2k-1})$$

$$a_{2k+1} = \frac{(2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-1} + 3^{2k-1})}{(1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})}$$

$$a_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2 & n = 2 \\ \frac{(1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})}{(2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-3} + 3^{2k-3})} & n = 2k; k \geq 2 \\ \frac{(2 + 3) (2^3 + 3^3) \dots (2^{2k-1} + 3^{2k-1})}{(1 + 1) (2^2 + 3^2) \dots (2^{2k-2} + 3^{2k-2})} & n = 2k + 1; k \geq 1 \end{cases}$$

## 4. Melléklet

### 4.1. A feladatok megoldása során használt összefüggések

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n i &= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2} \\ \sum_{i=1}^n i^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n^2+3n+1}{6} \\ \sum_{i=1}^n i^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{n^4+2n^3+n^2}{4} \\ \sum_{i=1}^n i^4 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} = \frac{6n^5+15n^4+10n^3-n}{30} \\ \sum_{i=1}^n i^5 &= \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12} = \frac{2n^6+6n^5+5n^3-n^2}{12} \\ \sum_{i=1}^n i^6 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^4+6n^3-3n+1)}{42} = \frac{6n^7+21n^6+21n^5-7n^3+n}{42} \\ \sum_{i=1}^n i^7 &= \frac{n^2(n+1)^2(3n^4+6n^3-n^2-4n+2)}{24} = \frac{3n^8+12n^7+14n^6-7n^4+2n^2}{24} \\ \sum_{i=1}^n i^8 &= \frac{n(n+1)(2n+1)(5n^6+15n^5+5n^4-15n^3-n^2+9n-3)}{90} = \\ &= \frac{10n^9+45n^8+60n^7-42n^5+20n^3-3n}{90} \\ \sum_{i=1}^n i^9 &= \frac{n^2(n+1)^2(n^2+n-1)(2n^4+4n^3-n^2-3n+3)}{20} = \\ &= \frac{2n^{10}+10n^9+15n^8-14n^6+10n^4-3n^2}{20} \end{aligned}$$

## 4.2. „Sima” számtani sorozat rekurzív kezelése

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned}a_n &= a_{n-1} + d \\a_{n-1} &= a_{n-2} + d \\&\dots \\a_3 &= a_2 + d \\a_2 &= a_1 + d\end{aligned}$$

Összeadva és rendezve

$$a_n = a_1 + d \cdot (n - 1)$$

## 4.3. „Sima” mértani sorozat rekurzív kezelése

Index léptetést végrehajtva

$$\begin{aligned}a_n &= a_{n-1} \cdot q \\a_{n-1} &= a_{n-2} \cdot q \\&\dots \\a_3 &= a_2 \cdot q \\a_2 &= a_1 \cdot q\end{aligned}$$

Egyik sor sem nulla, összeszorozva és rendezve

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

#### 4.4. Másodrendű, $a_n = c_1 \cdot a_{n-1} + c_2 \cdot a_{n-2}$ homogén rekurzió megoldása

$$a_1 = 7; a_2 = 17; a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$$

##### 4.4.1. Generátor-függvény módszerrel

$$f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + \dots + a_nx^n - 1 + \dots$$

Használjuk ezt a konkrét sorozatra:

$$\begin{aligned} f(x) &= a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + \dots + a_nx^n - 1 + \dots \\ 5xf(x) &= 5a_1x + 5a_2x^2 + 5a_3x^3 + 5a_4x^4 + \dots + 5a_nx^n + \dots \\ 6x^2f(x) &= 6a_1x^2 + 6a_2x^3 + 6a_3x^4 + 6a_4x^5 + \dots + 6a_nx^n + 1 + \dots \end{aligned}$$

A képzési szabályt figyelembe véve:

$$\begin{aligned} f(x)(1 - 5x + 6x^2) &= a_1 + x(a_2 - 5a_1) + x^2(a_3 - 5a_2 + 6a_1) + \\ &\quad \dots + x^{n-1}(a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2}) + \dots \\ f(x)(1 - 5x + 6x^2) &= a_1 + x(a_2 - 5a_1) = 7 - 18x \\ f(x) &= \frac{7 - 18x}{1 - 5x + 6x^2} \end{aligned}$$

Parciális törtekre bontva

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{7 - 18x}{1 - 5x + 6x^2} = \frac{4}{1 - 2x} + \frac{3}{1 - 3x} = \\ &= 4(1 + 2x + 2^2x^2 + 2^3x^3 + \dots + 2^{n-1}x^{n-1} + \dots) + \\ &\quad + 3(1 + 3x + 3^2x^2 + 3^3x^3 + \dots + 3^{n-1}x^{n-1} + \dots) = \\ &= (4 + 3) + x(4 \cdot 2 + 3 \cdot 3) + x^2(4 \cdot 2^2 + 3 \cdot 3^2) + \\ &\quad + \dots + x^{n-1}(4 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 3^{n-1}) + \dots \end{aligned}$$

Együtthatót azonosítva:

$$a_n = 4 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 2^n + 3^n$$

##### 4.4.2. Karakterisztikus egyenlettel

Keressük a megoldást  $a_n = C \cdot q^{n-1}$  alakban! Ekkor:

$$\begin{aligned} C \cdot q^{n-1} &= 5 \cdot C \cdot q^{n-2} - 6 \cdot C \cdot q^{n-3} \\ q^2 &= 5q - 6 \\ q^2 - 5q + 6 &= 0 \end{aligned}$$

Itt  $q=2$  és  $q=3$  is megoldás.

A végleges megoldást keressük e két megoldás lineáris kombinációjaként:

$$\begin{aligned} a_n &= C_1 \cdot 2^{n-1} + C_2 \cdot 3^{n-1} \\ \begin{cases} 7 = C_1 + C_2 \\ 17 = 2C_1 + 3C_2 \end{cases} &\Rightarrow C_1 = 4, C_2 = 3 \\ a_n &= 2 \cdot 2^n + 3^n \end{aligned}$$

**Ha megegyeznek a gyökök**

Legyen  $a_1 = 1$ ;  $a_2 = 5$ ;  $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$

Megoldva a két gyök egybeesik ( $=2$ ). Ekkor sorozatot keressük

$$a_n = C_1 \cdot q^{n-1} + n \cdot C_2 \cdot q^{n-1} = q^{n-1} (C_1 + nC_2)$$

Konkretizálva:

$$\begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 5 = 2C_1 + 4C_2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{2}, C_2 = \frac{3}{2}$$

A sorozat így:

$$a_n = -\frac{1}{2} \cdot 2^{n-1} + \frac{3}{2}n \cdot 2^{n-1} = (3n - 1) 2^{n-2}$$

#### 4.5. Periodikus, $a_n = \frac{a \cdot a_{n-1} + b}{c \cdot a_{n-1} + d}$ alakú sorozatok

A sorozat képzési szabályát alkalmazva azt akarjuk, hogy  $a_n = a_{n+hossz}$  legyen igaz minden elemre.

##### 4.5.1. Periódus hossza = 1

Feltétel:  $a = d; b = c = 0$

Példa:

$$\begin{aligned} \bullet a_n &= a_{n-1} \\ &\Rightarrow a_1; a_2 = a_1; \dots \end{aligned}$$

##### 4.5.2. Periódus hossza = 2

Feltétel:  $a + d = 0$

Példa:

$$\begin{aligned} \bullet a_n &= \frac{a_{n-1} + 3}{2a_{n-1} - 1} \\ &\Rightarrow a_1 = 5; a_2 = \frac{8}{9}; a_3 = 5 = a_1; \dots \\ &\Rightarrow a_1 = -2; a_2 = -\frac{1}{5}; a_3 = -2 = a_1; \dots \\ \bullet a_n &= \frac{2a_{n-1} + 5}{7a_{n-1} - 2} \\ &\Rightarrow a_1 = 5; a_2 = \frac{5}{11}; a_3 = 5 = a_1; \dots \\ &\Rightarrow a_1 = -2; a_2 = -\frac{1}{16}; a_3 = -2 = a_1; \dots \end{aligned}$$

##### 4.5.3. Periódus hossza = 3

Feltétel:  $a^2 + ad + d^2 + bd = 0$

Példa:

$$\begin{aligned} \bullet a_n &= \frac{a_{n-1} - 1}{7a_{n-1} + 2} \\ &\Rightarrow a_1 = 5; a_2 = \frac{4}{37}; a_3 = -\frac{11}{34}; a_4 = 5 = a_1; \dots \\ &\Rightarrow a_1 = -2; a_2 = \frac{1}{4}; a_3 = -\frac{1}{5}; a_4 = -2 = a_1; \dots \\ \bullet a_n &= \frac{a_{n-1} - 3}{a_{n-1} + 1} \\ &\Rightarrow a_1 = 5; a_2 = \frac{1}{3}; a_3 = -2; a_4 = 5 = a_1; \dots \\ &\Rightarrow a_1 = 2; a_2 = -\frac{1}{3}; a_3 = -5; a_4 = 2 = a_1; \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet a_n &= \frac{2a_{n-1} - 4}{7a_{n-1} + 4} \\
\Rightarrow a_1 &= 5; a_2 = \frac{2}{13}; a_3 = -\frac{24}{33}; a_4 = 5 = a_1; \dots \\
\Rightarrow a_1 &= -2; a_2 = \frac{4}{5}; a_3 = -\frac{1}{4}; a_4 = -2 = a_1; \dots
\end{aligned}$$

#### 4.5.4. Periódus hossza = 4

Feltétel:  $a^2 + 2bc + d^2 = 0$

Példa:

$$\begin{aligned}
\bullet a_n &= \frac{a_{n-1} - 1}{a_{n-1} + 1} \\
\Rightarrow a_1 &= 5; a_2 = \frac{2}{3}; a_3 = -\frac{1}{5}; a_4 = -\frac{3}{2}; a_5 = 5 = a_1; \dots \\
\Rightarrow a_1 &= -2; a_2 = 3; a_3 = \frac{1}{2}; a_4 = -\frac{1}{3}; a_5 = -2 = a_1; \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet a_n &= \frac{2a_{n-1} - 1}{4a_{n-1} + 2} \\
\Rightarrow a_1 &= 5; a_2 = \frac{9}{22}; a_3 = -\frac{1}{20}; a_4 = -\frac{11}{18}; a_5 = 5 = a_1; \dots \\
\Rightarrow a_1 &= -2; a_2 = \frac{5}{6}; a_3 = \frac{1}{8}; a_4 = -\frac{3}{10}; a_5 = -2 = a_1; \dots
\end{aligned}$$

#### 4.5.5. Periódus hossza = 5

Feltétel:  $b^2c^2 + bc(3a^2 + 4ad + 3d^2) + (a^4 + a^3d + a^2d^2 + ad^3 + d^4) = 0$

Példa:

$$\begin{aligned}
\bullet a_n &= \frac{a_{n-1} + \sqrt{20} - 5}{a_{n-1} + 1} \\
\Rightarrow a_1 &= 5; a_2 = \frac{\sqrt{5}}{3}; a_3 = 9\sqrt{5} - 20; a_4 = \frac{5 - 4\sqrt{5}}{11}; a_5 = \frac{\sqrt{5} - 5}{2}; \\
& a_6 = 5 = a_1; \dots \\
\Rightarrow a_1 &= -2; a_2 = 7 - 2\sqrt{5}; a_3 = \frac{\sqrt{5} + 4}{11}; a_4 = \frac{9\sqrt{5} - 20}{5}; a_5 = \frac{3 - 2\sqrt{5}}{3}; \\
& a_6 = -2 = a_1; \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet a_n &= \frac{\sqrt{20} - 6}{a_{n-1} + 2} \\
\Rightarrow a_1 &= 5; a_2 = \frac{2\sqrt{5} - 6}{7}; a_3 = \frac{49\sqrt{5} - 119}{11}; a_4 = -\frac{25\sqrt{5} + 23}{59}; \\
& a_5 = \frac{2\sqrt{5} - 16}{5}; a_6 = 5 = a_1; \dots \\
\Rightarrow a_1 &= -1; a_2 = 2\sqrt{5} - 6; a_3 = -\sqrt{5} - 1; a_4 = \sqrt{5} - 1; a_5 = 4 - 2\sqrt{5}; \\
& a_6 = -1 = a_1; \dots
\end{aligned}$$